



Kuva: Juha Pykälä

### Luonnehdinta

Runsaslajiset jäkkiniityt ovat jäkkivaltaisia niittyjä happamalla kasvualustalla. Ekologiset olosuhteet, kuten kosteus voivat vaihdella. Yleensä jäkkiniityt kuvastavat alueen pitkää perinteistä laidun- ja niittokäyttöä. Jäkkiä tulee kasvaa vähintään aarin kokoisella alueella, jotta niittyä voidaan pitää tähän luontotyyppiin kuuluvana. Luontotyypin nimestä huolimatta muu kasvillisuus ei aina ole kovin runsaslajista. Jäkkiniityt liittyvät lähes aina muihin niittytyyppeihin, jotka esiintyvät yleensä jäkkiniittyä laajempina. Luontotyyppiin luetaan yleisesti kuuluvaksi kansallisen kasvillisuustyyppityksen heinäkedot, tuoret heinäniityt, kosteat heinäniityt lukuun ottamatta kalkkivaikutteisia alueita sekä tuoret pienruohoniityt mikäli jäkki on niillä vallitseva. Myös merenrantojen ylärantaniittyjen jäkkivalentainen kasvillisuus kuuluu tähän luontotyyppiin. Jäkin lisäksi tyyppillisiä lajeja ovat mm. nurmirölli, huopakeltano, kanerva, hirssisara ja lampaannata.

Jäkkiniittyjen edustavuuden kannalta keskeisiä piirteitä ovat avoimuus, jäkkivalentaisuus sekä matala ja tuoreella niityllä esiintyessään monilajinen kasvillisuus.

### Esiintyminen

Luontotyyppiä esiintyy harvinaisena ja pienalaisena eri puolilla Suomea. Ypäjän hevoslaidun on esimerkki runsaslajisesta jäkkiniitystä.

### Nykytila ja uhkatekijät

Jäkkiniityt ovat olleet aiemmin Suomessa yleisiä, mutta ne ovat harvinaistuneet voimakkaasti laidunnus- ja niittokäytön loppumisesta seuranneen umpeenkasvun takia. Myös laiduntapojen muuttuminen laidunta rehevöittäväksi on huomattavasti heikentänyt kohteiden laatua. Muita jäkkiniittyjen taantumista tai häviämistä aiheuttavia tekijöitä ovat metsittäminen, rakentaminen ja pellonraivaus.