

Luonnehdinta

Etelänlepakko on kookas laji. Se painaa noin 18–25 g. Sen selkä on ruskea–tummanruskea, vatsapuoli vaaleanruskea–kellanruskea. Häntä jatkuu piikkinä häntäräpylän ulkopuolelle. Kuono on tummanruskea. Koon ja värityksen lisäksi lepakkolajit erotetaan toisistaan korvien ja korvankansien muodon, hampaiden, kuonon muodon, lentoräpylöiden kiinnityskohtien, lentotavan ja kaikuluotausäänten perusteella.

Elinympäristö ja levinneisyys

Etelänlepakko saalistaa avoimien metsäalueiden, metsänreunojen ja maatalousalueiden yläpuolella, mutta myös taajamissa. Sekä päiväpiilot että talvehtimispaiikat ovat usein löytyneet erilaisista rakennuksista, luolista tai kellareista. Laji on laajalle levinnyt Keski- ja Etelä-Euroopasta Kaakkois-Aasiaan asti. Suomea lähinnä olevilla esiintymisalueilla Liettussa, Latviassa, Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa laji on vähälukuinen. Suomesta laji on tavattu ensimmäisen kerran vuonna 2008, jolloin Hangossa havaittiin talvehtiva yksilö. Se löydettiin myöhemmin keväällä kuolleena. Tämän jälkeen laji on nähty ja valokuvattu kolme kertaa.

Nykytila ja uhkatekijät

Nykytiedon mukaan etelänlepakko on Suomessa satunnainen vierailija.

Hoitosuositukset

Lajin vierailuista ja mahdollisista pidempiaikaisista oleskeluista ja lisääntymisestä tarvitaan lisätietoja.

Lähteet

- Dietz, C., von Helversen, O. & Nill, D. 2009: Bats of Britain, Europe & Northwest Africa. – A&C Black Publishers Ltd, London.
- Hutson, T., Spitzenberger, F., Aulagnier, S., Coroiu, I. 2006: *Eptesicus serotinus*. – In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. [Viitattu 10.9.2010.] www.iucnredlist.org.
- Kinnunen, H., Kyheröinen, E.-M. ja Stjernberg, T. 2009: Suomen lepakot. – Luonnontieteellinen keskusmuseo [Viitattu 8.7.2010.] www.luomus.fi > Osallistu > Suomen lepakot.
- Kosonen, E. 2012: Etelänlepakko yllätti. – Suomen Luonto 71(9): 30-31.
- Lappalainen, M. 2008: Suomeen uusi nisäkäslaji: Etelänlepakko ilmestyi Hankoon. – Suomen Luonto 67 (8): 33.