

Niukka-keskiravinteiset järvet

Oligotrofa-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder

Luontodirektiivin luontotyyppi (liite I)
BOR suojelutaso epäsuotuisa riittämätön,
paraneva

Koodi: 3130

Luonnehdinta

Luontotyyppiin kuuluville vesille on luonteenomaista suuri vedenkorkeuden vaihtelu. Luontotyyppiin luetaan ns. mutayrttikasvillisuus, jota on esiintynyt esimerkiksi joidenkin reittivesien voimakkaan tulvan ajoittain paljaaksi jättämällä rannoilla; vallitsevina lajeina mm. mutayrtti, hapsiluikka ja rantaleinikki. Lisäksi luontotyyppiin luetaan vesistöt, joiden pohjaversoiskasvillisuudessa äimäruoho vallitsee. Tällaisia järviä esiintyy mm. Pohjois-Suomessa jokivesistöistä kuroutuneina. Luontotyyppi, sen ekologia ja esiintyminen sekä rajanveto muihin sisävesiluontotyyppisiin tunnetaan meillä heikosti. Luontotyyppi ei ole niin laaja-alainen, kuin sen suomenkielinen nimi antaa ymmärtää, vaan sen on määritetty tietynlaisen vesikasvillisuuden mukaan.

Luontotyyppin luonnontilaisuuden kannalta keskeisiä piirteitä ovat järivialtaan ja sen ranta-alueen rakenteellinen luonnontilaisuus (ei vesirakenteita, ruoppauksia, rantarakentamista), pohjan hyvä laatu (ei esim. liettymistä), luontotyyppille luonteenomaisen lajiston esiintyminen, luontainen vedenkorkeuden vaihtelu ja veden hyvä laatu (ei ylimääräistä happamoittavaa, rehevöittävää tai humus- ja kiintoainekuormitusta).

Levinneisyys

Levinneisyyttä ei tarkemmin tunneta, mutta todennäköisesti luontotyyppi on harvinainen.

Nykytila ja uhkatekijät

Vesien rehevöityminen ja likaantuminen on laaja-alaisesti sisävesiimme kohdistunut ja edelleen vaikuttava uhkatekijä. Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon myötä vesiensuojelun toimenpiteitä pyritään kuitenkin edelleen edistämään.