



Kuva: Metsähallitus/Helifoto Oy

## Luonnehdinta

Tuntureiden vyörySORAIKOT ja -LOHKAREIKOT ovat tunturialueen jyrkkien kallioseinämien rinteille ja juurelle muodostuneita kivikkoja ja louhikkoja. Ne ovat syntyneet pudonneesta tai vyöryneestä kiviaineksesta, joka on irronnut kallioseinämästä rapautumisen seurauksena.

Luontotyyppiin luetaan sekä karut että keskiravinteiset vyörySORAIKOT ja -LOHKAREIKOT, joissa kivilajeja muodostavat mineraalit ovat erilaisia silikaatteja, kuten kvartseja, maasälpää, pyrokseeneja tai amfioleja. Lähekkäin voi olla hyvin eri-ikäisiä vyörySORAIKOJA. Nuorten vyörySORAIKOJEN KIVET POIKEAVAT VÄRILTÄÄN YMPÄRISTÖN KIVISTÄ, SILLÄ NIIDEN PINNALLE EI OLE EHTINUT MUODOSTUA JÄKÄLÄPEITETTÄ.

VyörySORAIKOT OVA KASVILLISUUDELLE EPÄVAKAA JA HÄIRIÖHERKKÄ KASVUALUSTA. Kasvilajiston koostumus vaihtelee muun muassa kivilajin ravinteisuuden, pienilmaston, rinteiden suunnan sekä rapautumis- ja vyörymisherkkyiden mukaan. Karuimmilla vyörySORAIKOILLA LAJISTO ON NIUKKAA, KESKIRAVINTEISILLA JA

vähemmän happamilla soraikoilla monilajisempaa ja rehevämpää. Vakaammilla soraikoilla voi kasvaa jopa pensaita ja pohjakerroksen lajisto on samantyyppistä kuin karuilla tunturikankailla.

## Levinneisyys

Tuntureiden vyörySORAIKOJA ja -LOHKAREIKOJA esiintyy Pohjois-Lapissa, painopisteen ollessa erityisesti Käsivarren alueella, Kevon luonnonpuistossa sekä Paistunturin ja Muotkatunturin eräma-alueilla. Eteläisimmät esiintymät sijaitsevat Pelkosenniellä Pyhä-Luoston kansallispuistossa ja Sallassa Värriön luonnonpuistossa.

## Nykytila ja uhkatekijät

Luontotyyppiin ei kohdistu merkittäviä uhkia, ja ihmistoiminnan vaikutus on vähäinen. Lähes kaikki luontotyyppien esiintymät sijaitsevat Natura 2000-alueilla.