

FICOS-modellering VE1a

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	


Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2017-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	

©MML



Totalkväve,
juli-august



Totalfosfor,
juli-august



a-klorofyll,
juli-august



Totalkväve,
september-oktober



Totalfosfor,
september-oktober



FICOS-modellering VE1b

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	

Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	

Totalkväve,
juli-august



Totalfosfor,
juli-august



a-klorofyll,
juli-august



Totalkväve,
september-oktober



Totalfosfor,
september-oktober



FICOS-modellering VE1c

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	

Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	

©MML



FICOS-modellering VE2a

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	


Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	

©MML



FICOS-modellering VE2b

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	

Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	

©MML



**Totalkväve,
juli-august**



**Totalkväve,
september-oktober**



**Totalfosfor,
juli-august**



**Totalfosfor,
september-oktober**



**a-klorofyll,
juli-august**



Totalkväve,
juli-august



Totalfosfor,
juli-august



a-klorofyll,
juli-august



Totalkväve,
september-oktober



Totalfosfor,
september-oktober



FICOS-modellering
VE2c

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	


Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	





FICOS-modellering

VE3a

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	

Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	



Totalkväve,
juli-august



Totalfosfor,
juli-august



a-klorofyll,
juli-august



Totalkväve,
september-oktober



Totalfosfor,
september-oktober



FICOS-modellering
VE3b

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	

Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	




Totalkväve,
juli-august



Totalfosfor,
juli-august



a-klorofyll,
juli-august



Totalkväve,
september-oktober



Totalfosfor,
september-oktober



FICOS-modellering VE3c

Genomsnittlig ökning av
totalkvävekoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. N (µg/l)	11,01 - 13,75, <5%
0 - 2,75, <1%	13,76 - 16,5, <6%
2,76 - 5,5, <2%	16,51 - 19,25, <7%
5,51 - 8,25, <3%	19,26 - 22, <8%
8,26 - 11, <4%	

Genomsnittlig ökning av
totalfosforkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Tot. P (µg/l)	0,57 - 0,7, <5%
0 - 0,14, <1%	0,71 - 0,84, <6%
0,15 - 0,28, <2%	0,85 - 0,98, <7%
0,29 - 0,42, <3%	0,99 - 1,12, <8%
0,43 - 0,56, <4%	

Genomsnittlig ökning av a-
klorofyllkoncentrationen under
modellåren 2007-2012 i ytskiktet:
sommar: juli-august
höst: september-oktober

Chl a (µg/l)	0,085 - 0,105, <5%
0 - 0,021, <1%	0,106 - 0,126, <6%
0,022 - 0,042, <2%	0,127 - 0,147, <7%
0,043 - 0,063, <3%	0,148 - 0,168, <8%
0,064 - 0,084, <4%	