

Härmähuuhmarjäkäälä

Rödbrun blekspik
Sclerophora coniophaea

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)

Luonnehdinta

Härmähuuhmarjäkälän sekovarsi on alustansisäinen (ei siis yleensä näy kasvualustan pinnalla). Kotelomaljat ovat neula-maisia, rotevia, jopa 1,5 mm korkeita ja nuppi on 0,5 mm leveä. Jalka, nupin alapuoli ja yläpuolen itiömassa ovat yleensä paksun ruosteenpuna-ruskean härmän peitossa.

Elinympäristö ja levinneisyys

Härmähuuhmarjäkäälä kasvaa vanhoissa kosteissa ja varjoisissa metsissä lehtipuiden tyvirungoilla ja lahoppuulla, usein koivupötkelöillä, joskus myös kuusella. Lounais-Suomessa jäkälää tavataan myös vanhoilla jaloilla lehtipuilla, etenkin tammella. Levinneisyys selvästi kaksijakoinen, painopisteet ovat Lounais-Suomessa sekä Kuusamon ja Etelä-Lapin alueella. Muualla maassa harvinaisempi.

Nykytila ja uhkatekijät

Härmähuuhmarjäkälää uhkaavat metsien hakkuut, jotka muuttavat pienilmastoa lajille liian kuivaksi ja toisaalta hävittävät sopivia kasvualustoja. Suurin osa esiintymistä on suojelematta.

Hoitosuositukset

Härmähuuhmarjäkälän kasvupaikka tulisi rajata metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Kasvupaikan ympäristö tulisi säilyttää jatkuvasti peitteisenä, jotta pienilmasto ei muuttuisi harvennushakkuiden yhteydessä lajille liian kuivaksi.

Lähteet

Thor, G. & Arvidsson, L. (toim.). 1999. Rödlistade lavar i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 528 s.