

Haavannappijäkälä

Allékrimmerlav
Rinodina colobina

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen (CR)

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021)

Luonnehdinta

Haavannappijäkälä on kasvaa koko alapinnaltaan tiiviisti alustansa pintaan kiinnittyneenä tummanharmaana–harmaansinisenä, ohuena, rakeisena tai rupimaisena kasvustona. Haavannappijäkälän kotelomaljat ovat 0,4–0,7 mm levyisiä, kiekkomaisia ja mustia. Kotelomaljan reunus on sekovarren värinen tai vaaleampi, melko paksu, ja se voi olla sileä tai känsäinen. Kotelomaljoja on yleensä aika vähän.

Elinympäristö ja levinneisyys

Haavannappijäkälä kasvaa puolivaloisissa metsissä vanhojen lehtipuiden karkeakaarnaisilla tyvirungoilla, yleensä haavoilla. Laji tunnetaan Suomessa vain Uudeltamaalta, Satakunnasta ja Etelä-Hämeestä. Ainoa nykyesiintymä on Uudellamaalla.

Nykytila ja uhkatekijät

Haavannappijäkälä on taantunut metsien puulajisuhteiden muutosten sekä ilmansaasteiden takia ja ne uhkaavat lajia edelleen. Laji on taantunut myös lähialueilla, ja se tunnetaan erityisen herkkänä elinympäristöjen muutoksille. Yksikään esiintymä ei sijaitse suojelualueella.

Hoitosuositukset

Erityisesti suojeltavan haavannappijäkälän kasvupaikalla ja sen lähiympäristössä ei tehdä avohakkuita ja niillä suositaan vanhoja lehtipuita.

Lähteet

Lähteet

ArtDatabanken 2010. *Rinodina colobina*. [Viitattu 14.9.2011.]

http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Rinodina_Colobina_1828.pdf

Foucard, T. 2001. Svenska skorplavar och svampar som växer på dem. Interpublishing, Stockholm. 392 s.