

Käpäläkääpä

Isabellporing

Anomoporia bombycina

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)



Luonnehdinta

Yksivuotinen, pumpulinpehmeä käpäläkääpä kasvaa pitkin kuolleen puun pintaa eikä muodosta lakkia. Pillipinta on nuorena kermanvalkoinen ja muuttuu iän myötä harmahtavaksi tai laventelin sinisen sävyiseksi. Melko isot pillit ovat pyöreät tai sokkelomaiset. Pillipintaan tulee kynnellä painaen helposti kuoppa, joka värjäytyy tummaksi tai kellertäväksi.

Elinympäristö ja levinneisyys

Käpäläkääpä viihtyy melko kuivapohjaisissa tiheissä kangasmetsissä. Se kasvaa useimmiten valon puutteeseen kuolneiden kitukasvuisten mäntyjen ja kuusten osittain sammalikkoon uponneiden runkojen alapinnalla. Lajia esiintyy harvinaisena Lounais-Suomesta aina Kittilän Lappiin asti.

Nykytila ja uhkatekijät

Metsänhoidon yhteydessä kasvualustaksi soveltuvat kitukasvuiset puut yleensä poistetaan, ja siksi käpäläkääpä on harvinaistunut talousmetsissä. Energiapuun korjuu vähentää käpäläkäävän elinmahdollisuuksia.

Hoitosuositukset

Metsänkäsittelyssä tulisi jättää sopivia maapuita esiintymään tuntumaan ja muuallekin mustikkatyyppin metsiin käpäläkäävän säilymisen ja leviämisen turvaamiseksi.

Lähteet

- Hermansson, J. Faktablad: *Anomoporia bombycina* – mjukporing. Teoksessa Larsson, K.-H. (red.). 1997. Rödlistade svampar i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 547 s.
- Kotiranta, K. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa. 2. uudistettu painos. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 10. 184 s.
- Niemelä, T. 2005. Käävät, puiden sienet. Luonnontieteellinen keskusmuuseumo, Kasvimuseo, Helsinki. 319 s.

Kuva: Jorma Pennanen