

Kiiltوناava

Dvärgskägglav
Usnea glabrata

Uhanalaisuusluokka (IUCN): äärimmäisen uhanalainen (CR)

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021)

Luonnehdinta

Kiiltوناava on kellanvihreä, runsaasti haaroittuva puiden oksilla ja rungoilla roikkuva naava. Sen rangat ovat yleensä noin 5 cm pitkät, hennot, tyviltään usein kuroutuneet tai hie-man kuoppaiset. Haarojen kärjet ovat usein käyristyneitä.

Elinympäristö ja levinneisyys

Kiiltوناava kasvaa kosteissa, melko avoimissa lehti- ja sekametsissä, usein kulttuuriympäristöissä ja lähellä vesistöjä. Yleensä se kasvaa lepillä ja kuusella, harvoin muilla puilla. Esiintymiä tunnetaan 18 kpl ja ne sijaitsevat lähinnä Keski- ja Itä-Suomessa. Lajia on kuitenkin löytynyt Sompion Lapista asti. Mutta viime vuosikymmeninä kiiltوناavaa on löytynyt vain kerran (Oulun Pohjanmaa, Kuivaniemi 1989).

Nykytila ja uhkatekijät

Kiiltوناavaa uhkaavat pääasiassa metsien hakkuut, ojitukset ja rakentaminen. Kiiltوناava saattaa myös kärsiä ilmansaasteista.

Hoitosuositukset

Erityisesti suojeltavan kiiltوناavan kasvupaikka rajataan metsänkäsittelyn ulkopuolelle ja kasvupaikan ympäristö säilytetään jatkuvasti peitteisenä.

Lähteet

Thor, G. & Arvidsson, L. (toim.). 1999. Rödlistade lavar i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 528 s.