

Kirjoimikkäkärsäkäs

Större lungörtvivel
Mogulones larvatus

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)

Luonnehdinta

Kirjoimikkäkärsäkäs on 3,6–4,4 mm pitkä kärsäkäs, jonka selkäpuoli on musta. Sen peitinsiivissä on selkeä valkoinen kuviointi. Vatsapuoli on valkoinen.

Elinympäristö ja levinneisyys

Kirjoimikkäkärsäkäs elää rehevissä lehdoissa ja lehtomaisissa metsissä Etelä-Suomessa. Aikuisia yksilöitä on tavattu imikän (*Pulmonaria obscura*) lehdiltä kesällä kukinnan jo loputtua. Lajin biologia on melko huonosti tunnettu. Suomessa kirjoimikkäkärsäkästä on löydetty vain muutamalta paikalta Varsinais-Suomesta ja Keski-Uudeltamaalta. Tunnetut nykyesiintymät sijaitsevat Lohjalla, Nurmijärvellä, Siipossa, Mäntsälässä ja Pukkilassa. Kirjoimikkäkärsäkästä ei ole helppo löytää, joten sen esiintyminen on puutteellisesti tunnettu.

Nykytila ja uhkatekijät

Kirjoimikkäkärsäkästä uhannee lähinnä elinympäristöiksi sopivien lehtojen kuusettuminen. Useimmat tunnetuista esiintymistä sijaitsevat suojelualueilla.

Hoitosuositukset

Kirjoimikkäkärsäkkään elinympäristöjen hoidossa olisi tärkeintä varmistaa imikälle sopivien olosuhteiden säilyminen. Rehevät lehtolaikut ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden ominaispiirteitä ei saa muuttaa. Esimerkiksi avohakkuut ja auraukset ovat kiellettyjä. Umpeutuvista lehdoista voidaan tarvittaessa poistaa yksittäisiä kuusia ja kuusentaimia. Lehtojen vapaaehtoiseen suojeluun on mahdollista hakea rahoitusta METSO-ohjelman kautta.

Lähteet

Mannerkoski, I. 2000: *Ceutorhynchus larvatus* Schultze and *Ceutorhynchus pallidicornis* Gougelet & Brisout de Barneville: on *Pulmonaria obscura* living weevils in Finland (Coleoptera: Curculionidae). — Entomol. Fennica 11: 245–247.