

Lapinnädän serpentiinityypit

Fjällnörels serpentiintyper

Cherleria biflora

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)



Luonnehdinta

Lapinnätä on pienikokoinen (3–8 cm), mätästävä kohokki-kasvi. Sen varret ovat kohenevat tai pystyhyököt, tavallisesti karvaiset. Lehdet ovat lähes rihmamaiset, vihreät ja epäselvästi yksisuoniset. Valkoiset tai harvoin punertavat kukat ovat pareittain ja niiden terälehdet ovat kapean pitkulaiset.

Elinympäristö ja levinneisyys

Lapinnädän serpentiinityypit kasvaa Keski-Lapin metsäalueilla ultraemäksisillä kallioilla ja soraikoissa.

Nykytila ja uhkatekijät

Lapinnädän serpentiinityypin kasvupaikkoja on tuhoutunut ja uhkaa edelleen tuhoutua kaivannaistoiminnan seurauksena. Uhkana on myös kasvupaikkoja ympäröivien metsien uudistamis- ja hoitotoimet.

Hoitosuositukset

Lapinnädän serpentiinityypin kasvupaikka tulisi jättää kaivannaistoiminnan ulkopuolelle.

Lähteet

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.). 1998. Retkeilykasvio. 4. uudistettu painos. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. 656 s.

Kuva: Heikki Eeronheimo