



21. Isovarpuräme (IR)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:

Järven pohjoisrannalle kuvion 22 saranevan ja kuvion 23 lyhytkorsirämeen ympärille muodostunut isovarpuräme (IR). Kuviolla kasvaa mäntyä ja vähänlaisesti männyn ja koivun taimia. Isovarpuräme on säilynyt vähintään luonnontilaisen kaltaisena, ainoastaan kuvion länsipuolella on ojitus. Pohjakerroksessa kasvaa lähinnä räme- ja punarahkasammalta. Kuvion päävarpulajeina vallitsevat suopursu ja vaivaiskoivu. Kasvillisuudessa kasvaa muutoin juolukkaa, tupasvillaa, suomuurainta, variksenmarjaa ja muutamia maariankämmeköitä.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilaisen kaltainen kostea elinympäristö. Osa isovarpurämeistä lukeutuu metsälain 10 § suojeltuihin elinympäristöihin. Isovarpurämeet on arvioitu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Kuviolle tulisi tehdä metsälain 10 § mukainen rajausta. Vesitalous, puusto ja pienilmasto tulisi säilyttää ennallaan.





22. Oligotrofinen saraneva (OISN)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:

Järven pohjoisrannalla sijaitseva ojittamaton oligotrofinen saraneva (OISN) kuvion 21 isovarpurämeen ja kuvion 23 lyhytkorsirämeen vieressä. Muutamaa männyn taimea lukuun ottamatta kyseessä on avoin ja märkä suokuvio. Pohjakerroksen peittävät rahkasammaleet. Ruohovartisista kasveista esiintyy tiheänä kasvavaa pullo- ja jouhisaraa sekä tupasvillaa, isokarpaloa, suokukkaa ja maariankämmeekkää sekä vähän vaivaiskoivua. Raatetta kasvaa märimmissä osissa lähellä järvenrantaa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 3, koska kyseessä on edustava ja luonnontilainen saraneva. Saranevat on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia.





23. Oligotrofinen lyhytkorsiräme (OILkR)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Isovarpurämeen (kuvio 21) ja saranevan (kuvio 22) välissä olevan oligotrofinen lyhytkorsiräme (OIKIR). Kuviolla kasvaa harvakseltaan mätäspinoilla pienikokoista mäntyä sekä männyn taimia. Pohjakerroksen muodostavat rahkasammalet kuten räme- ja punarahkasammal. Mätäspinoilla kasvaa suokukkaa, vaivaiskoivua, karpalaa, variksenmarjaa ja tupasvillaa. Välikköpinoilla on jouhi- ja pallosaraa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 3, koska kyseessä on edustava ja luonnontilainen lyhytkorsiräme. Lyhytkorsirämeet on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia. Myös puusto tulisi säilyttää ennallaan.





24. Mustikkakangaskorpi (MKgK)

[EN]

Kasvillisuuskuvaus:


Kiilamainen järven rannan ja hakkuualueen välissä oleva mustikkakangaskorven (MKgK) suokuvio. Kuvion pääpuulaji on kuusi, mutta joukossa kasvaa myös jonkin verran hieskoivua ja harmaaleppää. Lahopuuta on jonkin verran. Pensaskerroksessa on pajuja ja pihlajaa. Pohjakerroksessa esiintyy korpi-karhun-, vaalearahka-, metsäkerros- ja seinäsammalta. Kenttäkerroksen valtalajeina kasvaa mustikkaa ja puolukkaa. Ruohovartisista kasveista esiintyy muun muassa metsäkortetta ja pallosaraa. Kosteissa painanteissa kasvaa myös vähän suomuurainta, suopursua ja raatetta.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 2, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilaisen kaltainen kostea elinympäristö. Elinympäristöjen uhanalaisuuden arvioissa kangaskorvet on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Vesitalous, pienilmasto ja puusto tulisi säilyttää ennallaan.





25. Korpiräme (KR)

[EN]

Kasvillisuuskuvaus:


Kangasmetsäalueiden väliselle alueelle järven rantaan muodostunut korpiräme (KR). Kuvion pääpuulaji on isokokoinen mänty, alikasvoksena esiintyy kuusta ja koivua. Pensaskerros muodostuu koivun, kuusen ja pihlajan taimista sekä katajasta. Pohjakerroksessa kasvaa rahkasammalia kuten rämerahkasammalta. Mättäillä kasvaa myös seinä- ja metsäkerrossammalta. Kenttäkerroksessa yleisimpänä kasvilajina on suopursu, jonka lisäksi esiintyy mustikkaa, puolukkaa, variksenmarjaa ja kangasmaitikkaa. Korpirämekuviolla on muutamia sammalen peittämiä lahopuita, eikä kuviolla ole havaittavissa ihmisen jättämiä jälkiä, vaan kuvio on kasvillisuudeltaan hyvin luonnontilainen.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 2, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilaisen kaltainen kostea elinympäristö. Elinympäristöjen uhanalaisuuden arviossa kangaskorvet on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Vesitalous, pienilmasto ja puusto tulisi säilyttää ennallaan.





26. Rahkaräme (RaR)

[LC]

Kasvillisuuskuvauk:


Ojittamaton luonnontilainen rahkaräme (RaR), joka sijaitsee louhikkoisten talousmetsäalueiden väliin jäävässä painanteessa. Kuviolla kasvaa kitukasvuista mäntyä ja männyn taimia. Rämeellä on kauttaaltaan rahkasammalmättäitä, vallitsevina lajeina ovat rusko-, puna- ja rämerahkasammalet. Myös harmaa- ja valkoporonjäkälää kasvaa paikoitellen. Suon rahkapinnalla kasvavia varpukasveja ovat variksenmarja, vaivaiskoivu, karpalo ja kanerva. Ruohovartisista kasveista esiintyy tupasvillaa, rahkasaraa, suomuurainta, suokukkaa, tupasluikkaa ja pyöreälehtikihokkia.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Rahkarämeet on luokiteltu elinvoimaisiksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia.





27. Tupasvillaräme (TR)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Jyrkähkön ja louhikkoisen talousmetsäalueen alapuolelle järven rantaan jäävä luonnontilaisen kaltainen tupasvillaräme (TR). Alueella ei ole ojituksia, mutta kuvion länsireunassa kulkee tuoreet ajojäljet viereiseen talousmetsään. Kuvion pääpuulaji on heikkokasvuinen mänty, jonka joukossa pensaskeroksessa on männyn ja koivun taimia sekä virpapajua. Pohjakerroksessa esiintyy räme-, puna- ja kangasraikasammalta. Varpukasveista kuviolla esiintyy vaivaiskoivua, juolukkaa, kanervaa, suopursua ja puolukkaa. Ruohovartisista kasveista valtalajina on tupasvilla. Lisäksi esiintyy suokukkaa, suomuurainta, jouhisaraa ja muutamia maariankämmeköitä.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilaisen kaltainen kostea elinympäristö. Tupasvillarämeet lukeutuvat metsälain 10 § suojeltuihin elinympäristöihin. Tupasvillarämeet on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Kuviolle tulisi tehdä metsälain 10 § mukainen rajausta. Vesitalous, pienilmasto ja puusto tulisi säilyttää ennallaan.





28. Oligotrofinen lyhytkorsineva (OILkN)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Harjumuodostelman länsipuolelle muodostunut märkä oligotrofinen lyhytkorsineva (OIKIN). Suoalueen länsipuolella olevat ojitukset ovat riittävän kaukana, joten neva-alue on säilynyt vähintään luonnontilaisen kaltaisena. Harjun ja suokuvion välissä on kuitenkin suhteellisen tuoreet ajojäljet. Neva on täysin avoin muutamaa pientä männyn taimea lukuun ottamatta. Pohjakerros koostuu kauttaaltaan rahkasammalista, pääosin räme-, puna- ja kalvakkarahkasammalista. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, rahkasaraa, pullosaraa, leväkköä ja lisäksi suovarvuista harvakseltaan vaivaiskoivua, suomuurainta ja suokukkaa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kyseessä on erottuva luonnontilaisen kaltainen kostea suokokonaisuus. Tupasvillarämeet lukeutuvat metsälain 10 § suojeltuihin elinympäristöihin. Lyhytkorsinevat on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Kuviolle tulisi tehdä metsälain 10 § mukainen raja. Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia.





29. Avolouhikko (Vr III)

[LC]

Kasvillisuuskuvaus:


Kivenlohkareiden peitossa oleva selvästi muusta ympäristöstään erottuva avolouhikko (Vr III) eli ns. pirunpelto talousmetsäalueen keskellä. Avolouhikon väleissä kasvaa kitukasvuisia mäntyjä ja pieniä koivuja sekä näiden taimia. Kasvillisuus on pääasiassa kivien päällä kasvavaa harmaa-, valko- ja palloporonjäkälää, tina- ja punatorvijäkälää sekä kaarrekarvetta ja kalliotierasammalta. Painanteissa on lisäksi seinäsammalta ja karhunsammalta. Kivikoiden välissä olevilla mätäillä kenttäkerroksen kasvillisuudessa vallitsevina lajeina kasvaa suopursua, juolukkaa, variksenmarjaa, mustikkaa, puolukkaa ja pallosaraa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (karukkokan- kaita vähätuottoisemmat alueet). Avolouhikot on arvioitu elinvoimaisiksi, säilyviksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto ja pienilmasto tulisi säilyttää ennallaan.





30. Ombrotrofinen kuljuneva (OmKuN) ja tupasvillaräme (TR)

[LC/NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Taloudsmetsäkäytössä olevien kangasmetsien välisessä painanteessa sijaitsevan suolammen ympärillä oleva suokokonaisuus, joka koostuu ombrotrofisesta kuljunevasta ja tupasvillarämeestä. Alueen luoteispuolelle on tehty tuore avohakkuu ja länsipuolella on syvät hakkuualueelle johtavat ajojäljet. Ympäristöviä taloudsmetsiä on myös harvennettu viime aikoina. Laajemmin suolammen länsi- ja etelärannalla sekä kapea kaistale lammen ympärillä on upottavaa ombrotrofista kuljunevaa (OmKuN). Rahkasammalpohjalla kasvaa kenttäkerroksessa runsaana leväkköä, valkopiirtoheinää, tupasluikkaa, pullosaraa, mutasaraa, tupasvillaa ja suokukkaa. Kuivemmilla mättäillä kasvaa myös vaivaiskoivuja ja suomuurainta. Lammen pohjois- ja itäpuolella olevalla tupasvillarämeellä (TR) pääpuulaji on heikkokasvuinen mänty, jonka joukossa pensaskerroksessa on männyn taimia. Pohjakerroksessa esiintyy räme-, puna- ja ruskorahkasammalta. Varpukasveista kuviolla kasvaa vaivaiskoivua, juolukkaa

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt). Kuljunevat on arvioitu elinvoimaisiksi (LC) elinympäristöiksi ja tupasvillarämeet silmälläpidettäväksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Vesitalous tulee säilyttää ennallaan välttämällä lisäojituksia.





31. Oligotrofinen sarräme (OISR)

[VU]

Kasvillisuuskuvaus:


Kangasmetsäalueen rajaamassa painanteessa oleva oligotrofinen sarräme (OISR). Rämeellä kasvaa pieniä mäntyjä ja koivuja. Pensaskerros koostuu näiden taimista. Pohjakerroksessa esiintyy kauttaaltaan rahkasammalmatto päälajeinaan räme- ja punarahkasammal, lisäksi kasvaa rämekarhunsammalta. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, pullo-, jouhi- ja rahkasaraa, suokukkaa, leväkköä, pyöreälehtiki-hokkia ja isokarpaloa. Kuvio on luonnontilaisen kaltainen, sillä ihmistoiminnan jälkiä kuviolla ei löydy itäpuolella olevaa ojitusta lukuun ottamatta.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 2, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilaisen kaltainen kostea elinympäristö. Elinympäristöjen uhanalaisuuden arvioinnissa sarrämeet on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi.

Maankäyttösuositukset:

Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia.





32. Tupasvillaräme (TR)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Pitkänomainen pohjois-eteläsuuntainen tupasvillaräme (TR), joka on rajattu luonnonsuojelualueeksi. Itäreunalla on vanha umpeenkasvanut ojitus, mutta kuvio on hyvin luonnontilainen. Rämeellä kasvaa kitukasvuista mäntyä, joiden joukossa pensaskerroksessa on ainoastaan männyn ja koivun taimia. Pohjakerroksessa esiintyy räme-, rusko- ja punarahkasammalta. Varpukasveista kasvaa vaivaiskoivua, juolukkaa, variksenmarjaa ja suopursua. Ruohovartisista kasveista valtalajina on tupasvilla, lisäksi esiintyy jouhisaraa, suokukkaa ja suomuurainta.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilainen kostea elinympäristö. Tupasvillarämeet lukeutuvat metsälain 10 § suojeltuihin elinympäristöihin. Tupasvillarämeet on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) elinympäristöiksi. Lisäksi kyseessä on luonnonsuojelualue.

Maankäyttösuositukset:

Suojelustatus tulee säilyttää. Vesitalous, pienilmasto ja puusto tulee säilyttää ennallaan.





33. Rahkaräme (RaR) ja oligotrofinen lyhytkorsineva (OILkN)

[LC/NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Reunaosiltaan ojitettu luonnontilaisen kaltainen rahkaräme (RaR), joka sijaitsee painanteessa talousmetsäsaarekkeen länsipuolella. Rahkarämeellä kasvaa kitukasvuista mäntyä ja männyn taimia. Rämeellä on kauttaaltaan rahkasammalmättäitä, vallitsevina lajeina ovat rusko- ja punarahkasammalet. Myös harmaa- ja valkoporonjäkälää kasvaa paikoitellen mättäillä. Suon rahkapinnalla on varpukasveja ovat variksenmarja, vaivaiskoivu ja juolukka. Ruohovartisista kasveista esiintyy tupasvillaa, suomuurainta, suokukkaa ja pyöreälehtikihokkia. Rahkarämeen keskellä on kaistale puutonta oligotrofista lyhytkorsinevaa (OILkN). Pohjakerros koostuu kauttaaltaan rahkasammalista ja kenttäkerroksessa kasvaa tupasluikkaa, tupasvillaa, rahkasaraa, leväkköä ja valkopiirtoheinää. Kuvio rajautuu viereiseen kuvion 34 tupasvillarämeeseen.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilaisen kaltainen kostea suokokonaisuus. Rahkarämet ja lyhytkorsinevat lukeutuvat metsälain 10 § suojeltuihin elinympäristöihin. Rahkarämet on luokiteltu elinvoimaisiksi (LC) elinympäristöiksi ja minerotrofiset lyhytkorsinevat silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Kuviolle tulisi tehdä metsälain 10 § mukainen raja. Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia.





34. Tupasvillaräme (TR)

[NT]

Kasvillisuuskuvauk:

Läntiseltä rajaltaan reunaoitettu tupasvillaräme (TR), joka rajautuu kuvion 33 rahkarämeeseen ja lyhytkorsinevaan. Rämeellä kasvaa pienikokoista mäntyä ja pensaskerroksessa männyn taimia. Pohjakerroksessa esiintyy rusko- ja rämerahkasammalta ja lisäksi seinäsammalta mättäillä sekä vähänlaisesti poronjäkäliä. Varpukasveista kuviolla kasvaa vaivaiskoivua, juolukkaa ja variksenmarjaa. Kenttäkerroksen ruohovartisista kasveista valtalajina on tupasvilla ja lisäksi esiintyy jouhisaraa, suokukkaa ja suomuurainta.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kyseessä on selvästi erottuva ja luonnontilainen kostea elinympäristö. Tupasvillarämeet lukeutuvat metsälain 10 § suojeltuihin elinympäristöihin. Tupasvillarämeet on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Kuviolle tulisi tehdä metsälain 10 § mukainen raja. Vesitalous tulisi säilyttää ennallaan välttämällä ojituksia.





35. Avolouhikko (Vr III)

[LC]

Kasvillisuuskuvaus:

Kivenlohkareiden peitossa oleva avolouhikko (Vr III) talousmetsäalueen keskellä. Kuviota ympäröivä alue on raskaasti käsitelty: ympärillä on ojituksia, viereisen metsäautotien vieressä on tuore avohakkuualue ja louhikon vieressä on ajojälkiä. Avolouhikon väleissä kasvaa pieniä mäntyjä ja koivuja sekä pensaskerroksessa männyn, koivun ja kuusen taimia sekä pajuja. Avolouhikon kivien päällä kasvaa harmaa- ja valkoporonjäkälää sekä tina- ja punatorvijäkälää. Louhikon viereisillä mäntäillä pohjakerroksessa on seinäsammalta ja kosteammissa painanteissa rahkasammalia. Kivikoiden välissä olevilla mäntäillä kenttäkerroksen kasvillisuudessa vallitsevia lajeja ovat suopursu, juolukka, variksenmarja, mustikka, puolukka ja pallosara.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (karukkokankaita vähätuottoisemmat alueet). Avolouhikot on arvioitu elinvoimaisiksi, säilyviksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Kuviolle tulisi tehdä metsälain 10 § mukainen rajausta. Puusto ja pienilmasto tulisi säilyttää ennallaan.

