



50. Varttunut mustikkatyypin (MT) tuore kangas

[EN]

Kasvillisuuskuvaus:


Osittain jyrkähkössä ja louhikkoisessa maastossa sijaitseva havupuuvaltainen tuore mustikkatyypin kangasmetsä, jossa valtapuuna on järeäkokoista kuusta. Sekapuustona kasvaa lisäksi joitakin kilpikaarnaisia mäntyjä. Pihlajan ja kuusen taimet muodostavat pensaskerroksen. Lahopuuta on runsaasti ja kivikkoisen kuvion peittää kauttaaltaan paksu sammalkerros. Pohjakerroksessa esiintyy metsäkerros-, seinä-, isokynsi- ja sulkasammalta. Valtavarpuuna on mustikkaa, puolukkaa on vähänlaisesti. Kenttäkerroksen muita kasvilajeina esiintyy oravanmarjaa, metsätähteä, metsälauhaa, lillukkaa, kevätpiippoa, metsäkortetta ja pallosaraa. Kuvio on ojittamaton, mutta sen länsilaidalla kulkee vanha sammaloitunut ajojälki. Metsäkuviolla ei ole nähtävissä metsätalouden jälkiä vaan kuvio on hyvin luonnontilainen. Kuvio rajoittuu osittain sen itäpuolella olevaan kuvion 49 kosteaan keskiravinteiseen lehtoon.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 2, koska metsä on luonnontilaista ja lahopuuta on muodostunut verraten paljon. Vanhat havupuuvaltaiset tuoreet kangasmetsät on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi (EN) luontotyypeiksi.

Maankäyttösuositukset:

Puusto ja pienilmasto tulisi säilyttää ennallaan.





51. Avolouhikko (Vr III)

[LC]

Kasvillisuuskuvaus:


Tuoreen laajahkon avohakkuualueen pohjoisreunalla oleva avolouhikko (Vr III) eli ns. pirunpelto, joka sijaitsee jyrkähkön mäenrinteen ja ojitetun metsäalueen välissä. Avolouhikon reunamilla kasvaa männyä, koivua ja kuusta, avolouhikossa ainoastaan näiden pieniä taimia. Avolouhikossa on kivien päällä harmaa-, valko- ja palloporonjäkälää, tina- ja punatorvijäkälää sekä kalliotierasammalta. Avolouhikon reunaosien mättäillä kasvaa pohjakerroksessa seinäsammalta ja kasvilajeina puolukkaa, mustikkaa ja suopursua.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (karukkokankaista vähätuottoisemmat alueet). Avolouhikot on arvioitu elinvoimaisiksi, säilyviksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Pienilmasto ja puusto tulee säilyttää ennallaan.





52. Avolouhikko (Vr III)

[LC]

Kasvillisuuskuvaus:


Kivenlohkareiden peitossa oleva selvästi muusta ympäristöstään erottuva avolouhikko (Vr III) eli ns. pirunpelto, jota ympäröi louhikkoinen sekapuustoinen metsäalue sekä avohakkuualue kuvion itäpuolella. Louhikossa kasvaa vähänlaisesti mäntyä ja koivua sekä niiden taimia. Kivien päällä on harmaa-, valko- ja palloporonjäkälää, tina- ja punatorvijäkälää, kaarrekarvetta sekä kalliotierasammalta. Avolouhikon reunaosien mätäillä kasvaa seinäsammalta ja kangaskarhunsammalta sekä varpukasveja; variksenmarjaa, kanervaa, mustikkaa ja suopursua. Louhikoiden välissä makaa vettä ja vesirajassa kasvaa rahkasammalia ja vehkaa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (karukkokan- kaita vähätuottoisemmat alueet). Avolouhikot on arvioitu elinvoimaisiksi, säilyviksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Pienilmasto ja puusto tulee säilyttää ennallaan.





53. Tupasvillaräme (TR) ja isovarpuräme (IR)

[NT]

Kasvillisuuskuvauk-


Kangasmetsien ympäröimässä painanteessa oleva ojittamaton luonnontilainen tupasvillaräme (TR), jonka reunoilla on isovarpurämettä (IR). Tupasvillarämeellä kasvaa heikkokasvuista mäntyä, joukossa on ainoastaan männyn taimia. Pohjakerroksessa esiintyy räme- ja punarahkasammalta. Varpukasveista kuviolla kasvaa vaivaiskoivua, variksenmarjaa ja juolukkaa. Ruohovartisista kasveista valtalajina on tupasvilla ja lisäksi esiintyy jouhisaraa, suokukkaa, suomuurainta, pyöreälehtikihokkia sekä vähän leväkköä ja kangasmaitikkaa. Tupasvillarämeen ja kangasmetsäalueiden välissä on mäntyä kasvavaa isovarpurämettä, jonka pohjakerroksessa esiintyy rusko-, räme- ja punarahkasammalta sekä vähän harmaaporonjäkälää. Kasvillisuudessa esiintyy korkeakasvuista suopursua sekä variksenmarjaa, juolukkaa ja suomuurainta.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Tupasvillarämeet ja isovarpurämeet on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





54. Tupasvillaräme (TR) ja ombrotrofinen kuljuneva (OmKuN)

[NT/LC]

Kasvillisuuskuvaus:


Kangasmetsien välisessä painaumassa oleva suokuvio, joka koostuu pääosin tupasvillarämeestä (TR) ja itäosassa avoimemmasta ja märemmästä ombrotrofisesta kuljunevasta (OmKuN). Tupasvillarämeellä kasvaa heikkokasvuista mäntyä sekä männyn ja harmaalepän taimia. Pohjakerroksessa esiintyy puna- ja rämerahkasammalta, myös ruskorahkasammalmättäitä on siellä täällä. Varpukasveista kuviolla kasvaa vaivaiskoivua, variksenmarjaa ja juolukkaa. Ruohovartisina kasveina on tupasvillaa, jouhisaraa, suokukkaa sekä ajoittain leväkköä ja raatetta ja muutama yksilö maariankämmeekkää. Kuljunevalla kasvaa ainoastaan muutamia männyn ja koivun taimia. Rahkasammalpohjalla on kenttäkerroksessa runsaana valkopiirtoheinää, rahka- ja mutasaraa, leväkköä ja suokukkaa. Lisäksi esiintyy tupasvillaa, vaivaiskoivua, pikkukarpaloa, raatetta ja pyöreälehtikihokkia.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Tupasvillarämeet on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi ja kuljunevat elinvoimaisiksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





55. Oligotrofinen saraneva (OISN)

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:

Ojittamaton luoteis-kaakkosuuntainen pitkänomainen oligotrofinen saraneva (OISN) talousmetsäkäytössä olevien kangasmetsien rajaamassa painaumassa. Muutamaa männyn ja koivun taimea lukuun ottamatta kyseessä on avoin ja märkä suokuvio. Pohjakerroksen peittävät rahkasammalet, kuten räme- ja sararahkasammal. Kuviolla on myös sammalettomia rimpilaikkuja. Korkeakasvuiset pullosara ja jouhisara sekä raate muodostavat tiheän kenttäkerroksen. Lisäksi kuviolla kasvaa luhta- ja tupasvillaa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Saranevat on arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





56. Ombrotrofinen kuljuneva (OmKuN) ja isovarpuräme (IR)

[LC/NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Talousmetsäkäytössä olevien louhikkoisten kangasmetsien välisessä painanteessa oleva pyöreähkön muotoinen suokuvio, joka koostuu pääosin avoimesta ombrotrofisesta kuljunevasta (OmKuN) ja reunoiltaan isovarpurämeestä (IR). Märällä kuljunevalla kasvaa puustossa ainoastaan muutamia kitukasvuisia mäntyjä sekä männyn taimia. Kenttäkerroksen valtalajeina rahkasammalpinnalla on runsaana valkopiirtoheinää, mutasaraa ja leväkköä. Mätäspinoilla punarahkasammaleella kasvaa variksenmarjaa, suokukkaa, tupasluikkaa, tupasvillaa, pyöreälehtikihokkia ja isokarpaloa. Osittain esiintyy myös erittäin märkää sammaleetonta ruoppapintaa. Kuljunevaa ympäröivällä isovarpurämeellä kasvaa mäntyä ja vähän koivun taimia. Varpukasveista esiintyy suopursua, vaivaiskoivua, juolukkaa ja variksenmarjaa, ruohovartisista kasveista pallosaraa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Kuljunevat on luokiteltu elinvoimaisiksi (LC) elinympäristöiksi ja isovarpurämeet silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





57. Hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) kostea lehto

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Notkossa puronvarressa sijaitseva kostea hiirenporras-käenkaalityypin lehto (AthOT). Puronvarrella kasvaa monipuolinen puusto, joka koostuu kuusista, hieskoivuista ja haavoista. Lahopuuta on runsaasti. Pensaskerroksen muodostavat kuusen ja pihlajan taimet sekä vadelmat. Pohjakerros on aukkoinen ja sammallajeina esiintyy okarahka- ja vaalearahkasammalta, lehtokarhunsammalta, metsäkerros- ja metsäliekosammalta ja metsälehväsammalta. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa kasvaa saniaislajeista so-reahiirenporrasta, korpi-imarretta, metsäimarretta ja metsäalvejuurta. Muita runsaimpina kasvilajeina on käenkaalia, oravanmarjaa, suo-orvokkia, lillukkaa, metsäkurjenpolvea metsäkortetta ja kultapiiskua. Mättäillä kasvaa myös paikoin vähän puolukkaa, mustikkaa, riidenliekoa ja vanamoja.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, kuvio on rajattu metsälain 10 § erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt). Kosteat keskiravinteiset lehdot on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





58. Lähde

[VU]

Kasvillisuuskuvauk:


Kuusimetsän keskellä rinteessä sijaitseva selvästi erottuva avolähde. Lähteen ympärillä kasvaa varttunutta kuusikkoa ja muutama raita, pensaskerros puuttuu. Pohjakerroksessa on muun muassa kiiltolehvä-, lähdelelvä- ja purosukerosammalta sekä maksa- ja rahkasammalia, mättäillä kasvaa metsäkerrosammalta. Avolähteen ympärillä kasvillisuudessa esiintyy mustikkaa, käenkaalia, soreahiirenporrasta, metsäimarretta, oravanmarjaa, vanamoja ja metsäkortetta.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, kuvio on rajattu metsälain 10 § erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt). Lähde on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





59. Hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) kostea lehto

[NT]

Kasvillisuuskuvaus:


Notkossa puronvarressa sijaitseva hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) kostea lehto, jota ympäröivät hakkuualat. Puronvarressa kasvaa monipuolinen puusto ja lahoppuustoa on paljon. Puusto koostuu kuusista, hieskoivuista, haavoista, männyistä ja harmaalepistä. Pensaskerroksen muodostavat kuusen ja pihlajan taimet. Pohjakerroksessa esiintyy muun muassa vaalearahka-, suikero- ja lehväsamalia. Kenttäkerroksessa kasvaa soreahiirenporrasta, korpi-imarretta, kotkansiipeä, metsäimarretta, lillukkaa, metsäkortetta ja korpikastikkaa sekä puronvarressa myös mesiangervoa.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, kuvio on rajattu metsälain 10 § erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (pienvesistöjen välittömät lähiympäristöt). Kosteet keskiravinteiset lehdot on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.





60. Oligotrofinen saraneva (OISN), oligotrofinen sararäme (OISR), tupasvillaräme (TR), isovarpuräme (IR) ja rahkaräme (RaR) [NT/VU/NT/NT/LC]

Kasvillisuuskuvauk:


Ojittamaton laajahko suokokonaisuus, jossa on useita eri suotyyppisiä. Alueen keskivaiheilla avonainen osa on oligotrofista saranevaa, jossa kasvaa muutamia männyn ja koivun taimia. Pohjakerros muodostuu pääosin räme- ja sararahkasammalista. Kasvillisuudessa esiintyy jouhi- ja riippasaraa, raatetta, suokukkaa, leväkköä ja pienikasvuista vaivaiskoivua. Alueen keski- ja pohjoisosissa on sararämettä, joka vaihtuu tupasvillarämeeksi. Oligotrofisella sararämeellä kasvaa mäntyä ja koivuja sekä näiden taimia. Pohjakerroksessa esiintyy rahkasammalta päälajeina räme- ja punarahkasammal. Lisäksi on rämekarhunsammalta. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, jouhi-, pullo-, rahka- ja jokapaikansaraa, raatetta, suokukkaa, leväkköä ja isokarpaloa. Maariankämmeä esiintyy paikoin. Mäntyä kasvavilla tupasvillarämekuvioilla kenttäkerroksessa on tupasvillaa, jouhisaraa, vaivaiskoivua, vaiveroa, suokukkaa, isokarpaloa ja pyöreälehtikihokkia. Pohjakerroksen muodostavat räme- ja punarahkasammaleet. Suon eteläisimmässä osassa on kitukasvuista männikköä kasvavaa isovarpurämettä, jonka pohjakerroksessa on rahkasammalia ja seinäsammalta sekä kenttäkerroksessa suopursua, vaivaiskoivua, variksenmarjaa ja vaiveroa sekä suomuurainta, pallosaraa ja tupasvillaa. Isovarpurämeen pohjoispuolella on kaistale pienikokoista mäntyä ja niiden taimia kasvavaa rahkarämettä, jonka pohjakerros on kauttaaltaan etenkin rahkasammalien peittämä.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Elinympäristöjen uhanalaisuuden arvioinnissa sararämet on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi, saranevat, tupasvillarämet ja isovarpurämet silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi ja rahkarämet elinvoimaisiksi (LC) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Vesitalous ja puusto tulee säilyttää.





61. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas

[NT]

Kasvillisuuskuvauk:


Ojittamattoman suokokonaisuuden (kuvio 60) keskellä oleva kangasmetsäsaareke, joka on mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Puuston muodostavat varttuneet männyt ja kuuset. Lisäksi kasvaa pienikokoista koivua sekä kuusen taimia. Katajaa esiintyy metsäkuvion reunalla. Pohjakerroksessa on metsäkerros- ja seinäsammalta. Valtavarpuna kasvaa mustikkaa, puolukkaa on vähänlaisesti. Kenttäkerroksen muina kasvilajeina esiintyy pallosaraa, metsätähteä, oravanmarjaa, metsäkortetta ja metsätähteä. Metsäkuviolla ei ole nähtävissä metsätalouden jälkiä vaan kuvio on erittäin luonnontilainen.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, kuvio on rajattu metsälain 10 § erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (ojittamattomien ja/tai vesitaloudeltaan pääosin muuttumattomina säilyneiden soiden keskellä sijaitsevat kangasmetsäsaarekkeet). Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT) elinympäristöiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto ja pienilmasto tulee säilyttää ennallaan.





62. Oligotrofinen sararäme (OISR)

[VU]

Kasvillisuuskuvaus:

Painanteessa oleva selvästi ympäristöstään erottuva oligotrofinen sararäme (OISR). Rämeellä kasvaa vähänlaisesti kitukasvuista mäntyä ja männyn taimia. Pohjakerroksessa vallitsevat rusko-, räme- ja punarahkasammalet. Nevaväliköissä kasvaa pullo- ja jouhisaraa, tupasvillaa, raatetta, tupasluikkaa ja järvikortetta. Mätäspinnoilla kenttäkerroksessa on vaivaiskoivua, suokukkaa, variksenmarjaa, isokarpalaa ja pyöreälehtikihokkia. Myös maariankämmeekkää esiintyy jonkun verran.

Suojeluperuste / arvotus (1–3):

Arvotus: 1, koska kuvio on rajattu metsälain 10 §:n arvokkaaksi elinympäristöksi (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot). Elinympäristöjen uhanalaisuuden arvioinnissa sararämeet on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi.

Maankäyttösuositukset:

Metsälain mukaiset. Puusto, pienilmasto ja vesitalous tulee säilyttää ennallaan.

