

Merilettotähtimö

Strandsumparv

Stellaria crassifolia var. *minor*

Uhanalaisuusluokka (IUCN): erittäin uhanalainen (EN)

Uhanalainen ja erityisesti suojeltava (LSA 521/2021)



Luonnehdinta

Merilettotähtimö on lettotähtimön (*S. crassifolia*) harvinainen merenrantarotu, jolla on valkoiset, pienet kukat. Vihreät lehdet ovat kaljut ja kapeanpuikeat, kapeammat kuin lettotähtimöllä. Merilettotähtimö on myös lettotähtimöä monivartisempi, rennompi, mätästävämpi ja pienempikukkainen.

Elinympäristö ja levinneisyys

Merilettotähtimö kasvaa merenrantojen tuntumassa rantakorvissa ja luhtaisilla soistumilla. Sitä on tavattu vain muutamalta paikalta Hankoniemellä ja Korppoon ulkosaaristossa Jurmon saarella.

Nykytila ja uhkatekijät

Merilettotähtimö on kärsinyt laidunpaineen pienenemisestä johtuvasta elinympäristöjen umpeenkasvusta, ja sitä uhkaavat edelleen rantojen umpeenkasvu ja rehevöityminen. Luontaiset rantavoimat ajoittain muovaavat kasvupaikkoja etenkin Jurmossa. Kaikki merilettotähtimön kasvupaikat ovat suojeltuja

Hoitosuositukset

Erityisesti suojeltavan merilettotähtimön esiintymien säilyttämiseksi elinvoimaisena kasvupaikkoja tulisi hoitaa. Kasvupaikkoja kuivattavia ojia tulisi tukkia ja kasvipeitettä pitää avoimena esimerkiksi laidunnuksen tai niiton avulla. Myös tervaleppien poisto voi olla tarpeen.

Lähteet

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.). 1998. Retkeilykasvio. 4. uudistettu painos. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki. 656 s.

Laine, U. 1997. Merilettotähtimö – havssumpstjärnblomma. Teoksessa Ryt-täri, T. & Kettunen, T. (toim.). Uhanalaiset kasvimme. Suomen ympäristökeskus ja Kirjayhtymä Oy, Helsinki. S. 252.

Kuva: Henry Väre, CC-BY-NC-4.0, [Laji.fi](https://laji.fi)