

Liite 2. Kuikkasuon luontotyyppikohteiden kuvaukset

ID	81
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (pikkujoet ja purot 3260)
Lakistatus	Vesilain mukainen vesistö, jonka luonnontilan vaarantaminen vaatii lupaa (vesilaki 3:2)
Pituus	470 m
Luontotyytit	Havumetsävyöhykkeen purot ja pikkujoet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kallio-ojan n. 0,5 km:n pituinen osuus. Uoman molemmin puolin kasvaa satunnaisesti jakautuneena koivuja ja kuusia sekä muutama harmaaleppä. Puustossa on hieman ikävaihtelua ja kerroksellisuutta. Lahopuuta on hyvin niukasti. Pensaskerros on niukka ja koostuu lähinnä kuusista. Molemmin puolin uomaa on kosteaa runsasravinteista lehtoa, jonka kasvillisuus on rehevää. Uoma mutkittelee vain vähän, ja vedessä on vain hyvin niukasti lahopuuta eikä lainkaan kiviä. Aivan uoman yllä on lähinnä mesiangervopusikkoa, joten varjostusta on niukasti. Uoman ympärillä ei ole pengerryksen jälkiä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	Huomioitu suoraan edustavuuden kriteeristössä



ID	82
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (lehdot 9050)
Pinta-ala	1,32 ha
Luontotyytit	Kosteat runsasravinteiset lehdot, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Kallio-ojan molemmin puolin esiintyvää kosteaa runsasravinteista lehtoa, jossa kasvaa satunnaisesti jakautuneena koivuja ja kuusia sekä muutama harmaaleppä. Puustossa on hieman ikävaihtelua ja kerroksellisuutta. Lahopuuta on hyvin niukasti. Pensaskerros on niukka ja koostuu lähinnä kuusista. Kenttäkerros on rehevää: itäosassa uomaa mesiangervo ja korpikastikka ovat selkeitä valtalajeja, muutoin esiintyy mm. korpi-imarretta, harmaasaraa, metsäimarretta, metsäkortetta, sudenmarjaa (*Paris quadrifolia*), metsäalvejuurta, kurjenjalkaa ja oravanmarjaa. Pohjakerros on aukkoinen ja koostuu lähinnä korpilahkasammalesta ja lehvasammalista. Kuvion ympärillä on paljon ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	83A–83N
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (aapasuot 7310) Vastuuluontotyyppi (aapasuot)
Pinta-ala	59,50 ha
Luontotypit	Keskiboreaaliset aapasuot, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kohteet 83A–83N muodostavat yhdessä aapasuokokonaisuuden. Alueella on mm. lyhytkorsirämeitä, isovarpurämeitä sekä rahkarämeitä. Aapasuota ympäröivät ojat sekä turvetuotantoalue, joten sen vesitalous ei ole luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	83A
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,64 ha
Luontotypit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi

Alueen puusto koostuu melko harvaan kasvavista nuorista männyistä. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, variksenmarjaa, muurainta, suokukkaa sekä matalaa suopursua. Pohjakerroksessa vallitsee ruskorahkasammal. Alueen pohjoisosan lähellä on ojituksia, mutta ne eivät ole vaikuttaneet alueen vesitalouteen merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	83B–83C
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,11 ha + 0,06 ha
Luontotyypit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueet ovat kangasrämettä, joiden puusto on iältään vaihtelevaa, pääosin varttunutta männikköä, jossa on myös joitakin aiemman sukupolven mäntyjä seassa. Alueilla on myös muutama nuori koivu. Joitain jälkiä aikaisemmista hakkuista. Kenttäkerroksessa on melko matalaa suopursua ja juolukkaa, kanervaa ja variksenmarjaa sekä paikoin runsaastikin pallosaraa. Pohjakerroksessa on seinäsammalta ja rahkasammalia (varvikko- ja kangasrahkasammalta) lähes yhtä paljon. Lahopuuta on kuvioilla melko niukasti. Alueet sijaitsevat pääosin ojittamattomalla suolla, mutta itäisimmän alueen lähetyillä on oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	83D
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	3,13 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on lyhytkorsirämettä, jonka puustossa on eri-ikäisiä mäntyjä. Joukossa on myös muutamia hieman vanhempia mäntyjä. Kenttäkerroksessa on mm. tupasvillaa ja rahkasaraa (*Carex pauciflora*), mättäillä on kanervaa. Pohjakerroksessa on varvikko- ja kalvakkarahkasammalta, lisäksi on ruskorahkasammalmättäitä. Varsinkin alueen itäosassa ruskorahkasammalmättäitä on runsaasti. Kuviolla on joitain keloja lähinnä suoalueen länsiosissa. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	83E
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,78 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto koostuu iältään hieman vaihtelevasta männiköstä, mutta vanhimmat männyt puuttuvat. Kenttäkerroksessa on mm. tupasvillaa ja rahkasaraa, mättäillä kasvaa kanervaa ja vaivaiskoivua. Alueella on melko runsaasti mätäspintaa. Pohjakerroksessa kasvaa varvikko- ja kalvakkarahkasammalta, lisäksi on ruskorahkasammalmättäitä ja seinäsammalta. Ojat ovat heikentäneet vesitaloutta hieman, minkä vuoksi varpuisuus on lisääntynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	83F
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	4,43 ha
Luontotyytit	Kalvakkarämet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on kalvakkarämettä, jossa kasvaa muutama yksittäinen mänty mättäillä. Kenttäkerroksessa on suokukkaa, mättäillä on vaivaiskoivua. Tupasluikkaa kasvaa paikoin runsaastikin. Pohjakerroksen valtalaji on paakkurahkasammal. Kuviolla on rimpipintoja ja ruoppaa runsaasti. Alueen läpi kulkee suhteellisen iso oja, joka on kuivattanut aluetta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID		83G	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi	
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala		0,94 ha	
Luontotyypit		Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Saranevaa, jossa kasvaa harvakseltaan muutamia nuoria mäntyjä. Kenttäkerroksessa on pullosaraa, jouhisaraa, mutasaraa, raatetta, suokukkaa sekä mättäillä vaivaiskoivua. Pohjakerrosta peittää sararahkasammal. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojia.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		B (hyvä)	A (luonnontilainen)
			

ID	83H
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	39,98 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lähes puutonta lyhytkorsirämettä, kitukasvuisia mäntyjä kasvaa lähinnä pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa tupasvilla, rahkasara ja tupasluikka vallitsevat, lisäksi siinä kasvaa mm. riippa- ja mutasaraa, leväkköä, niukasti jouhisaraa sekä mättäillä mm. variksenmarjaa. Pohjakerroksessa kurjenrahkasammal on valtalaji, lisäksi on ruskorahkasammalmättäitä sekä räme- ja punarahkasammalta. Alueella on rimpipintoja. Ojia on aivan suoalueen reunoilla, mutta suo on niin laaja-alainen, ettei sen vesitalous ole heikentynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erittäin arvokkaat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID		83I	
Rajausperuste		Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala		0,39 ha	
Luontotyytit		Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi	
Rahkarämekuvio, jossa kasvaa kitukasvuista, iältään hieman vaihtelevaa männikköä sekä puusto- että pensaskeroksessa. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerros koostuu kanervasta, variksenmarjasta, muuraimesta, tupasvillasta, vaivaiskoivusta ja juolukasta. Pohjakerrosta valtaa lähinnä ruskorahkasammal. Kuvion lähettyvillä ei ole oja.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
			

ID	83J
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,36 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isovarpurämettä, jolla kasvaa sekä riukumaista että vähän kookkaampaa männikköä, jossa on jonkin verran ikävaihtelua. Lahopuuta on niukasti, kuviolla on yksi vähän kookkaampi kelo. Kenttäkerroksessa kasvaa suopursua, juolukkaa ja variksenmarjaa, pohjakerros taas koostuu lähinnä rämerahkasammalesta. Alueen lähellä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	83K
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,74 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Suoalueen reunassa esiintyvää lyhytkorsirämettä, jossa kasvaa iältään vain niukasti vaihtelevaa männikköä sekä puusto- että pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, tupasluikkaa, mutasaraa, suokukkaa sekä niukasti raatetta, pullosaraa ja kurjenjalkaa. Kuviolla on runsaasti mätäspintoja, joiden pohjakerroksessa kasvaa lähinnä ruskorahkasammalta. Alueen vieressä kulkee isohko oja, jonka vaikutuksesta puuston kasvu on alkanut lisääntymään kuviolla.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	83L
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,38 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Pieni isovarpurämekuvio, jolla kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä: seassa on sekä nuoria että varttuneempia, kilpikaarnaisia mäntyjä. Lahopuuta on melko niukasti. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat suopursu ja juolukka, lisäksi kasvaa puolukkaa, variksenmarjaa, mustikkaa, muurainta ja pallosaraa. Pohjakerros koostuu seinäsammalesta ja rämerahkasammalesta. Alueen puustossa tai muussa kasvillisuudessa ei näy selkeitä muutoksia ympäröivistä ojista huolimatta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	83M
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,36 ha
Luontotyytit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi

Rahkarämettä, jolla kasvaa siellä täällä kitukasvuista männikköä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa on mm. variksenmarjaa, vaivaiskoivua, suokukkaa, muurainta ja tupasvillaa. Pohjakerroksen valtalaji on ruskorahkasammal, jonka peittämiä mätäspintoja esiintyy runsaasti. Kuviolla on selkeitä maanmuokkauksen jälkiä, jotka ovat paikallisesti vaikuttaneet kasvillisuuteen. Lisäksi alueen molemmin puolin kulkee isoja oja. Lajisto on kuitenkin säilynyt pääpiirteissään luonteenomaisena, eikä puuston kasvu ole lisääntynyt merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	83N
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,63 ha
Luontotyypit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isovarpurämettä, jolla kasvaa riukumaista männikköä, seassa myös muutamia kookkaampia mäntyjä. Kuvion eteläosissa on myös muutamia koivuja. Lahopuuta on hyvin niukasti. Kenttäkerroksen selkeä valtalaji on tiheään kasvava vaivaiskoivu, lisäksi mm. tupasvillaa, raatetta, kurjenjalkaa, pullosaraa, suokukkaa ja muurainta. Pohjakerros koostuu lähinnä rämerahkasammalesta. Ympäröivien oijen vaikutuksesta alueella on merkkejä puuston kasvun lisääntymisestä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	84
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,45 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isovarpurämettä, jonka puusto koostuu riukumaisesta, melko tasaikäisestä männiköstä. Seassa on myös koivuja ja niukasti kuusia. Lahopuuta ei ole. Myös pensaskerroksessa on mäntyjä, koivuja ja kuusia. Kenttäkerroksen valtalajit ovat vaivaiskoivu ja juolukka, lisäksi kasvaa mm. variksenmarjaa, raatetta, suokukkaa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa on räme- ja punarahkasammalta. Kuvion ympärillä on ojia sekä hakkuualueita, ja puuston kasvu vaikuttaa lisääntyneen hieman.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	85A–85J	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (aapasuot 7310) Vastuuluontotyyppi (aapasuot)	
Pinta-ala	22,33 ha	
Luontotypit	Kes kiboreaaliset aapasuot, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Kohteet 85A–85J muodostavat yhdessä aapasuokokonaisuuden, joka jatkuu hankealueen ulkopuolelle. Alueella on mm. tupasvillärämeitä, isovarpurämeitä, rimpinevarämeitä sekä lyhytkorsievoja. Aapasuon eteläpuolella on ojituksia, joten sen vesitalous ei ole lounnontilaisen kaltainen.		
Arvaluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	85A
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,27 ha
Luontotyytit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on nuorta, harvaa mäntyä. Kenttäkerroksessa tupasvilla on valtalaji, lisäksi kasvaa variksenmarjaa, suokukkaa sekä muutamia vaivaiskoivuja. Pohjakerroksessa on räme-, puna- ja ruskorahkasammalta. Alueen lähellä on oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut kuvion vesitalouteen merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	85B
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,54 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on isovarpurämettä, jonka puusto koostuu varttuneesta männiköstä. Kenttäkerroksen valtalajit ovat suopursu ja kanerva, lisäksi kasvaa juolukkaa ja pallosaraa. Pohjakerroksessa on kangas- ja varvikkorahkasammalta. Kuvio sijaitsee kangasmaan ja suoalueen rajalla. Alueen eteläosan lähellä on ojituksia, jotka eivät ole kuitenkaan merkittävästi vaikuttaneet kuvion vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	85C
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,44 ha
Luontotyytit	Mineotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lyhytkorsinevaa, jossa kasvaa harvakseltaan nuoria mäntyjä, myös pensaskerroksessa on joitain männyn taimia. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, rahkasaraa, leväkköä, riippasaraa sekä niukasti pallosaraa. Mättäillä on variksenmarjaa ja muurainta. Pohjakerroksessa kasvaa sara-, puna- ja kalvakkarahkasammalta, lisäksi alueella on ruskorahkasammalmättäitä. Oja kulkee alueen eteläreunassa, minkä vuoksi kuviolla on merkkejä taimettumisesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	85D
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,38 ha
Luontotyyppi	Mineotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Kuvio on lyhytkorsinevaa, jossa kasvaa muutamia yksittäisiä nuoria ja matalia mäntyjä. Kenttäkerroksessa kasvaa leväkköä, rahkasaraa, tupasvillaa sekä niukasti pullosaraa. Pohjakerroksessa on kalvaka- ja sararahkasammalta sekä hieman rimpipintoja. Alueen etelälaidan lähellä on ojia, mutta ne eivät ole vaikuttaneet kuvion vesitalouteen merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	85E
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,22 ha
Luontotyypit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto koostuu nuoresta männiköstä, jossa on hieman ikävaihtelua. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, muurainta sekä variksenmarjaa. Ojaa kohden suopursu ja vaivaiskoivu runsastuvat ja suo vaihtuu vähitellen isovarpurämeeksi. Pohjakerroksessa on räme-, puna- ja ruskorahkasammalta. Alueen lounaisreunassa on oja, jonka kuivattavasta vaikutuksesta johtuen suo muuttuu isovarpurämeeksi lähempänä ojaa.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	85F
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,48 ha
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puusto on melko nuorta männikköä, mutta mukana on myös vanhoja mäntyjä. Kenttäkerroksessa nevaosuuksilla on leväkköä runsaasti, lisäksi esiintyy tupasvillaa. Mättäillä on suokukkaa, muurainta ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on vajorahkasammalta (*Sphagnum majus*), ruskorahkasammalmättäitä sekä rimpipintoja. Lahopuuta alueella on muutaman kelon verran. Alueen itäpuolella on ojituksia, mutta vesitalous ei ole heikentynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID		85G	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala		14,25 ha	
Luontotyytit		Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste		Luokka II: Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet	
Laaja rimpinevarämealue, jonka mätäspinoilla kasvaa kitukasvuisia mäntyjä. Puustossa on hieman ikävaihtelua. Lahopuuta ei ole. Alueella on rimpi-, väli- ja mätäspintojen mosaiikkimaista vaihtelua. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasluikkaa, raatetta, suokukkaa, vaivaiskoivua, rahkasaraa, leväkköä, mutasaraa sekä niukasti pullosaraa. Pohjakerroksessa on mm. rusko-, ruso- ja kalvakkarahkasammalta sekä sirppisammalia. Alueen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen eteläosassa kulkevasta ojasta huolimatta.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet		B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
			

ID	85H
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,49 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Puutonta saranevaa, joka rajautuu pohjoisessa hankealueen ulkopuolella sijaitsevaan Kuikkalampeen. Pensaskerroksessa on muutamia mäntyjä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat jouhi- ja juurtosara, lisäksi kasvaa raatetta, järvikortetta, suokukkaa, tupasvillaa, mutasaraa ja kurjenjalkaa. Pohjakerroksen valtalaji on sararahkasammal. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä kuvion lähetyvillä ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	85I	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,12 ha	
Luontotypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Pienialainen lyhytkorsiräme, jossa kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa tavataan tupasluikkaa, rahkasaraa, tupasvillaa, raatetta sekä vaivaiskoivua. Pohjakerros koostuu enimmäkseen rämerahkasammalesta. Kuvion vesitalous on luonnontilainen, eikä alueen lähetyvillä ole ojia tai muita selkeitä merkkejä ihmisvaikutuksesta.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	85J
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,82 ha
Luontotypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Laajemman suoalueen reunassa esiintyvää sararämettä, jonka valtapuusto on tasaikäistä männikköä. Seassa kasvaa jonkin verran koivuja lähinnä pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa tavataan mm. raatetta, vaivaiskoivua, juolukkaa, suopursua, tupasvillaa, kurjenjalkaa sekä isokarpaloa. Pohjakerroksessa kasvaa rämerahkasammalta ja niukasti kalvakkarahkasammalta. Kuviolla on merkkejä taimettumisesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	86
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,07 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isovarpurämettä, jonka puusto koostuu iältään niukasti vaihtelevasta, kitukasvuisesta männiköstä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksen valtalaji on vaivaiskoivu, lisäksi tavataan variksenmarjaa, tupasvillaa, isokarpalaa, suokukkaa sekä niukasti raatetta ja jouhisaraa. Pohjakerroksessa kasvaa räme- ja punarahkasammalta sekä seinäsammalta. Kuvion pohjoispuolella kulkee tie, ja itäosastaan alue rajautuu sähkövoimalinjaan. Räme on alkanut muuttua koilliskulmastaan turvekankaaksi, ja taimettumisen merkkejä on havaittavissa.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	87
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,46 ha
Luontotyytit	Kalvakkarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Kalvakkarämettä, jonka mätäspinoilla kasvaa iältään jonkin verran vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta ei ole. Mätäspintojen lisäksi alueella on rimpi- ja välipintoja. Kenttäkerroksen valtalajeina vuorottelevat jouhi- ja mutasara, tupasluikka sekä tupasvilla, lisäksi esiintyy suokukkaa, raatetta ja rahkasaraa. Pohjakerroksessa on kalvaka-, puna- ja rämerahkasammalta. Kuvion länsipuolella kulkee iso oja, jonka välittömässä läheisyydessä olevat suoalueet ovat alkaneet kuivumaan. Alueella on merkkejä taimettumisesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	88	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	1,91 ha	
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Lyhytkorsirämekuvio, jonka mätäspinnoilla kasvaa mäntyjä sekä puusto- että pensaskerroksessa. Puustossa on jonkin verran ikävaihtelua, lahoppuuta ei ole. Kenttäkerroksessa tavataan vaivaiskoivua, variksenmarjaa, tupasvillaa, raatetta, suokukkaa, mutasaraa, leväkköä ja tupasluikkaa. Pohjakerroksessa kasvaa rusko-, ruso- ja rämerahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähettyvillä ole oja tai muita selkeitä merkkejä ihmistoiminnasta.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	89
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (vaihtelutissuot ja rantasuot 7140)
Pinta-ala	0,49 ha
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Hyvin niukkapuustoista saranevaa, kitukasvuisia mäntyjä esiintyy lähinnä pensaskerroksessa siellä täällä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat pullo- ja jouhisara, lisäksi tavataan raatetta, järvikortetta, tupasvillaa, vaivaiskoivua sekä niukasti suokukkaa. Pohjakerros koostuu lähinnä sara- ja rämerahkasammalesta. Kuvion itäosassa kulkee sähkövoimalinja. Lähellä ei ole ojia, ja alueen vesitalous on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID 90		
Rajausperuste Uhanalainen luontotyyppi		
Pinta-ala 0,77 ha		
Luontotyytit Minerotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi		
Sähkövoimalinjan alla sijaitsevaa puutonta lyhytkorsinevaa, ainoastaan pensaskerroksessa on siellä täällä kitukasvuisia mäntyjä. Lahopuuta ei ole. Alueella on myös jonkin verran rimpipintoja. Kenttäkerroksen kasvillisuus koostuu leväköstä, tupasluikasta, tupasvillasta, raatteesta, järvikortteesta, suokukasta sekä niukasta luhtavillasta. Pohjakerroksessa on silmäkerahkasammalta (<i>Sphagnum balticum</i>). Kuvion vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID 91		
Rajausperuste Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)		
Pinta-ala 0,92 ha		
Luontotyytit Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi		
Tupasvillarämettä, jossa kasvaa kitukasvuista männikköä. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasvilla, lisäksi kasvaa mm. tupasluikkaa. Pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Alueen vieressä kulkee melko iso oja, mutta vesitalous on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	92
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,17 ha
Luontotypit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Pieni isovarpurämekuvio, jolla kasvaa melko tasaikäistä männikköä, seassa on myös nuorempia kuusia. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerros koostuu suopursusta, vaivaiskoivusta, juolukasta, variksenmarjasta, pallosarasta ja muuraimesta. Pohjakerroksen valtalaji on rämerahkasammal. Kuvion vesitalous on luonnontilainen, oja ei ole lähettyvillä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	93
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,50 ha
Luontotyypit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kangasrämettä, jonka puusto koostuu enimmäkseen tasaikäisestä männiköstä, jossa on myös nuorempia kuusia seassa. Pensaskerroksessa on niukasti koivuja. Lahopuuta on hyvin niukasti. Kenttäkerroksen valtalaji on suopursu, mutta myös mustikkaa ja puolukkaa on runsaasti. Lisäksi tavataan mm. juolukkaa. Pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Alueen länsipuolella kulkee iso oja, joka ei kuitenkaan ole kuvion välittömässä läheisyydessä eikä täten vaikuta sen vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	94
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	5,01 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lyhytkorsirämettä, jonka mätäspinoilla kasvaa kitukasvuisia mäntyjä enimmäkseen pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Alueella on mätäspintojen lisäksi selkeitä väli- ja rimpipintoja, joiden välillä kenttäkerroksen valtalajit vaihtelevat: kuviolla esiintyy yleisesti mm. tupasluikkaa, leväkköä, tupasvillaa, mutasaraa, raatetta ja suokukkaa. Kuvion länsiosissa on keskimäärin enemmän vaivaiskoivumättäitä, ja eteläosissa taas rimpipinnat vallitsevat yleisemmin kuin muualla. Alueen läpi kulkee sähkövoimalinja, jonka rakenteiden alla kasvaa pajuja. Ojia sen sijaan ei ole kuvion välittömässä läheisyydessä. Paikoin alueella on nähtävissä lieviä merkkejä taimettumisesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	95	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,50 ha	
Luontotyytit	Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Tupasvillarämettä, jonka puusto koostuu kitukasvuisesta männiköstä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerros koostuu lähinnä tupasvillasta, suokukasta ja muuraimesta. Pohjakerroksessa on mm. rämerahkasammalta. Kuvion välittömässä läheisyydessä ei ole oja.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	96
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,42 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Sararämettä, jossa kasvavassa männikössä on ikävaihtelua. Seassa on myös koivuja. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa tavataan tupasvillaa, pullosaraa, viitakastikkaa, raatetta, vaivaiskoivua, suokukkaa ja muurainta. Pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Alueen lähistöllä on kaksi isompaa ojaa, joiden välittömässä läheisyydessä suo on alkanut muuttua turvekankaaksi – kyseiset alueet on jätetty tässä rajauksen ulkopuolelle. Puuston kasvun lisääntymisestä on kuitenkin merkkejä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	97	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,46 ha	
Luontotyypit	Sarakorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Alueen puusto koostuu kitukasvuisista koivuista ja männyistä sekä puusto- että pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa on mm. pullosaraa, tupasvillaa ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa tavataan rämerahkasammalta. Alueen lähellä kulkee sähkövoimalinja, ja eteläpuolella kulkevan ojan vaikutuksesta ojan lähiympäristö on alkanut muuttua turvekankaaksi – nämä alueet on jätetty rajauksen ulkopuolelle.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)

ID	98
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)
Pinta-ala	0,09 ha
Luontotyytit	Muurainkorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Ojien sekä muuttuma- ja turvekangasalueiden ympäröimää muurainkorpea, jossa kasvaa tiheästi nuoria koivuja ja mäntyjä. Myös muutamia varttuneempia puita esiintyy, lahoppua ei ole. Kenttäkerroksessa muurain on paikoitellen selkeä valtalaji, lisäksi mm. tupasvillaa ja pallosaraa. Pohjakerroksessa kasvaa varvikkorahkasammalta. Alueella on selkeitä vesitalouden muutoksen merkkejä, kuten taimettumista.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	99
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,56 ha
Luontotyypit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi

Rahkarämettä, jossa kasvaa iältään hieman vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta ei ole. Valtaosalla alueesta on mätäspintoja, jonkin verran esiintyy myös välipintoja. Kenttäkerroksen yleisimpiä lajeja ovat variksenmarja, juolukka, muurain, suokukka ja tupasvilla. Pohjakerroksessa on enimmäkseen ruskorahkasammalta. Alueen vieressä kulkee oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut suon vesitalouteen merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	100
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,22 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lyhytkorsirämettä, jossa kasvaa kitukasvuista männikköä puusto- ja pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Välipintojen lisäksi mätäspintojakin on runsaasti. Kenttäkerroksessa kasvaa mättäillä suokukkaa, variksenmarjaa, vaivaiskoivua ja muurainta, välipinnoilla taas rahkasaraa, suokukkaa, mutasaraa, tupasvillaa ja tupasluikkaa. Pohjakerroksessa on rusko- ja punarahkasammalta. Alueen vierestä kulkee oja ja tie, ja reunassa on taimettumisen merkkejä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	101
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,10 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Sararämettä, jossa kasvaa harvakseltaan kitukasvuisia mäntyjä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa tavataan mm. jouhisaraa, vaivaiskoivua ja suokukkaa. Pohjakerroksessa on mm. rämerahkasammalta. Alueen lähistöllä kulkee tie ja oja, jotka eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet vesitalouteen merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	102	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,17 ha	
Luontotyypit	Ruohokorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Tien vieressä esiintyvää ruohokorpea, jossa kasvaa tiheästi nuoria koivuja, myös mäntyjä on seassa. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. raatetta, viitakastikkaa ja kurjenjalkaa. Pohjakerroksessa tavataan mm. vaalearahkasammalta (<i>Sphagnum centrale</i>). Vieressä kulkeva tie ja melko lähellä olevat ojitukset ovat aiheuttaneet taimettumista.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)

ID	103
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (vaihtelumuissuot ja rantasuot 7140)
Pinta-ala	0,07 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on saranevaa, jossa kasvaa muutama yksittäinen hieskoivu sekä pensaskerroksessa muutama männyn taimi. Kenttäkerroksessa on runsaasti riippasaraa, lisäksi kasvaa viitakastikkaa, jouhisaraa, tupasvillaa, luhtavillaa sekä raatetta. Pohjakerroksessa on varvikko- ja sararahkasammalta, kangaskarhunsammalta (*Polytrichum juniperinum*) sekä niukasti okarahkasammalta ja ruoppapintoja. Noin 40 metrin päässä alueesta kulkee tie sekä oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	104	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen 1 luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	5,40 ha	
Luontotypit	Sarakorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste	Luokka II: Ennallistamiskelpoiset ojitetut korvet, joiden puustossa on luonnontilaisuuteen liittyviä rakennepiirteitä (luontainen uudistuminen, erirakenteisuus, lahoppuustoisuus tai sekapuustoisuus) tai niissä on korpilajistoa jäljellä	
Puusto on nuorta ja hieskoivuvaltaista, seassa on myös kuusia ja muutama mänty. Puusto on paikoin riu'ukkoa. Pensaskerroksessa on pajuja. Kenttäkerroksessa kasvaa raatetta runsaasti, lisäksi on luhtasaraa (<i>Carex vesicaria</i>), kurjenjalkaa, korpikastikkaa sekä jouhi- ja riippasaraa paikoin. Pohjakerroksessa on sara- ja okarahkasammalta. Alueella on myös paikoin rimpipintoja. Alueen itäreunassa kulkee oja, lisäksi pohjoisosassa on tie sekä suuri oja.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	105
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (vaihtelumuissuot ja rantasuot 7140)
Pinta-ala	0,94 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Saranevaa, jossa kasvaa joitakin mäntyjä ja hieskoivuja. Kenttäkerroksessa on runsaasti jouhisaraa ja raatetta, lisäksi esiintyy tupasvillaa, vaivaiskoivua sekä niukasti kurjenjalkaa. Pohjakerroksessa vallitsee sararahkasammal. Suoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	106
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	4,47 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen pohjoisosassa kasvaa nuoria ja matalia mäntyjä. Etelään päin puusto vähenee ja on korkeampaa, lisäksi puuttomia mättäät lisääntyvät. Pensaskerroksessa on joitain kuusen taimia alueen pohjoisosassa. Kenttäkerroksen valtalajina on tupasvilla, lisäksi esiintyy muta-, rahka- ja juurtosaraa. Paikoin on myös jouhisaraa, erityisesti alueen pohjoisosassa. Eteläosassa olevilla mättäillä on muurainta ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on kurjen-, puna- ja paakkurahkasammalta. Ruskorahkasammalmättäitä on varsinkin alueen eteläosassa. Suoalueen välittömässä läheisyydessä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (vähän heikentynyt)	B (vähän heikentynyt)



ID	107	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,37 ha	
Luontotypit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Alueen puusto on männikköä, jossa seassa on muutamia kuusia. Männyt ovat pääasiassa varttuneita. Alueella on myös joitain vanhoja kantoja. Kenttäkerroksen valtalajina on tupasvilla, lisäksi alueella esiintyy variksenmarjaa ja muurainta. Lännen kangasmaata kohti myös suopursu ja juolukka lisääntyvät ja alue vaihettuu kangasmaaksi. Pohjakerroksessa on varvikko- ja punarahkasammalta, lisäksi seinäsammalta kasvaa paikoitellen lännessä. Lahopuuta alueella on niukasti. Suoalue sijoittuu kangasmaan ja suon väliin, eikä sen välittömässä läheisyydessä ole oja.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	108
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)
Pinta-ala	0,85 ha
Luontotyytit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on pääosin nuorta männikköä. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasvilla, lisäksi alueella kasvaa vaivaiskoivua ja muurainta. Lännen kangasmaata kohti myös suopursu ja juolukka lisääntyvät ja alue vaihtuu kangasmaaksi. Pohjakerroksessa on varvikko- ja rämerahkasammalta, lisäksi esiintyy ruskorahkasammalmättäitä. Suoalue sijoittuu kangasmaan ja suon väliin, eikä sen välittömässä läheisyydessä ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	109
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	2,14 ha
Luontotyytit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Kalvakkanevakuvio, jolla ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. tupasvillaa, tupasluikkaa ja suokukkaa. Pohjakerroksen valtalaji on paakkurahkasammal, lisäksi esiintyy kalvakka- ja kurjenrahkasammalta. Paikoin on rimpipintoja. Oja kulkee suoalueen itä laidalla, mutta kasvillisuus ei ole muuttunut.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	110
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,56 ha
Luontotyypit	Kalvakkarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on pääosin nuorta männikköä, seassa on myös muutama hieskoivu. Kenttäkerroksessa on eniten juolukkaa sekä vaivaiskoivua, lisäksi seassa kasvaa tupasvillaa ja tupasluikkaa. Pohjakerroksessa esiintyy kalvaka-, varvikko- ja punarahkasammalta. Ojia kulkee suoalueen reunoilla sekä alueen keskellä. Tämän vuoksi varpuisuus ja puuston kasvu ovat lisääntyneet.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	111
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (vaihtelumuissuot ja rantasuot 7140)
Pinta-ala	0,36 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on saranevaa, jossa on joitakin männyn ja hieskoivun taimia varsinkin alueen reunalla. Kenttäkerroksessa kasvaa jouhisaraa ja pullosaraa on runsaasti, lisäksi kasvaa rahkasaraa, tupasluikkaa sekä niukasti vaivaiskoivua ja raatetta. Pohjakerroksessa on räme- ja sararahkasammalta. Oja kulkee vähän matkan päässä suosta, mutta alue ei ole kuivunut.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	112
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	4,99 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puustossa on paikoittain eri-ikäisiä mäntyjä, mutta suurin osa puustosta on nuorta. Kuviolla on myös muutama vanha mänty. Lisäksi alueella on nuoria kuusia ja hieskoivuja. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa ja vaivaiskoivua runsaasti, lisäksi siinä kasvaa juolukkaa ja muurainta. Pohjakerroksessa esiintyy varvikko-, räme- ja punarahkasammalta. Lisäksi seinäsammalta on melko runsaasti. Ojia kulkee suoalueen läpi, ja alueella on tapahtunut kuivumista.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	113
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,29 ha
Luontotyypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on sararämettä, jossa kasvaa harvakseltaan nuoria ja matalia mäntyjä. Lisäksi pensaskerroksessa on männyn ja kuusen taimia. Kenttäkerroksessa on pullo-, jouhi-, rahka- ja luhtasaraa, tupasluikkaa, vaivaiskoivua sekä raatetta. Pohjakerroksessa esiintyy sara-, räme- ja varvikkorahkasammalta. Oja kulkee lähellä alueen länsireunaa, mutta vesitalous ei ole merkittävästi heikentynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	114
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,19 ha
Luontotyytit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi

Alueen puusto on pääasiassa nuorta männikköä, jossa on myös muutamia vanhempia mäntyjä joukossa. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa ja rahkasaraa, mättäillä kasvaa muurainta sekä variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on paljon ruskorahkasammalmättäitä ja lisäksi niukasti mm. punarahkasammalta. Ojia ei ole alueen välittömässä läheisyydessä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	115
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,31 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on nuorta, harvaa männikköä, jossa osa männyistä on pensaskerroksessa. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat tupasvilla ja rahkasara, lisäksi esiintyy niukasti raatetta, muurainta, isokarpaloa sekä vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta, ja alueen pohjoisosassa on ruskorahkasammalmättäitä. Mättäät lisääntyvät pohjoista kohti. Oja kulkee melko lähellä alueen pohjoisosassa, jossa suo on hieman kuivunut.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	116	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)	
Pinta-ala	0,29 ha	
Luontotyytit	Metsäkortekorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO-valintaperuste	Luokka II: Ennallistamiskelpoiset ojitetut korvet, joiden puustossa on luonnontilaisuuteen liittyviä rakennepiirteitä (luontainen uudistuminen, erirakenteisuus, lahoppuistoisuus tai sekapuustoisuus) tai niissä on korpilajistoa jäljellä	
Alueen puustossa on nuorta kuusta ja mäntyä arviolta saman verran, myös nuorta koivua on melko runsaasti. Kenttäkerroksen valtalaji on metsäkorte, lisäksi esiintyy mustikkaa ja pallosaraa. Pohjakerroksessa kasvaa korpi- ja varvikkorahkasammalta sekä korpikarhunsammalta. Suo on kangasmaan vieressä. Kuvion läheltä kulkee yksi oja, joka on kuivattanut aluetta hieman.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	117
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,92 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on nuorta männikköä, joukossa on myös muutama hieskoivun taimi. Kenttäkerroksessa tupasvilla on valtalaji, lisäksi esiintyy vaivaiskoivua, raatetta, riippasaraa sekä niukasti suursaroja. Pohjakerroksessa vallitsee rämerahkasammal. Alueen eteläpuolelta kulkee oja, jonka vuoksi alue on hieman kuivahtanut ja varpuisuus lisääntynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	118	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (pikkujoet ja purot 3260)	
Lakistatus	Vesilain mukainen vesistö, jonka luonnontilan vaarantaminen vaatii lupaa (vesilaki 3:2)	
Pituus	5,54 km	
Luontotyypit	Havumetsävyöhykkeen pikkujoet ja purot, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Uomaa ympäröivä puusto koostuu pääasiassa kuusista ja koivuista, joissa on ikävaihtelua. Puusto varjostaa uomaa vaihtelevissa määrin: varjostusta on enemmän uoman kaakkois- ja keskiosissa. Uoma mutkittelee koko matkaltaan, mutta vedessä ei ole juurikaan kiviä. Lahopuuta sen sijaan on sekä vedessä että uoman yllä niukasti tai kohtalaisesti, mutta lähinnä vain puron länsiosuksilla. Samoin länsiosissa uomaa on jonkin verran verran nopeuden ja poikkileikkauksen vaihtelevuutta, kuten suvantopaikkoja. Puron varrella ei ole selkeitä perkauksen merkkejä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	Huomioitu suoraan edustavuuden kriteeristössä
		

ID	119	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)	
Pinta-ala	0,14 ha	
Luontotyytit	Muurainkorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste	Luokka II: Ennallistamiskelpoiset ojitetut korvet, joiden puustossa on luonnontilaisuuteen liittyviä rakennepiirteitä tai niissä on korpilajistoa jäljellä	
Kinttaisojan varrella sijaitsevaa muurainkorpea, jossa kasvaa iältään vaihtelevia kuusia ja koivuja. Lahopuuta on kuviolla niukasti. Kenttäkerroksen valtalaji on muurain, lisäksi kasvaa mm. puolukkaa ja pallosaraa. Pohjakerros koostuu lähinnä korpilahkasammalesta, joka peittää suurimman osan alueesta. Kuvion vieressä on ojituksia, jotka eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet alueen lajistoon.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	120–122
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	3,39 ha + 0,39 ha + 1,08 ha
Luontotyypit	Ruohokorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kinttaisojaa ympäröivää, paikoin rehevääkin ruohokorpea, jonka puusto koostuu pääasiassa kuusista ja koivuista, joissa on jonkin verran ikävaihtelua. Lahopuuta on niukasti. Pensaskerroksessa kasvaa paikoin mm. korpipaatsamaa (*Frangula alnus*). Kenttäkerroksessa kasvaa metsäkortetta, korpikastikkaa, raatetta, mesiangervoa, hiirenporrasta (*Athyrium filix-femina*), metsä- ja korpi-imarretta, muurainta, kurjenjalkaa, suo-orvokkia, mustikkaa ja puolukkaa. Kenttäkerros on melko aukkoista ja koostuu mm. korpirahkasammalesta ja lehväsammalista. Ruohokorpialueiden lähellä on koko Kinttaisojan matkalla ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	123–124
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (lehdot 9050)
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (rehevät lehtolaikut)
Pinta-ala	1,88 ha + 0,94 ha
Luontotyytit	Kosteat runsasravinteiset lehdot, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Kinttaisojaa ympäröivää rehevää lehtoa, jonka puusto koostuu iältään jonkin verran vaihtelevista kuusista ja koivuista. Lahopuuta on niukasti. Pensaskerroksessa kasvaa niukasti mm. korpipaatsamaa, pihlajaa ja kuusta. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. kotkansiipeä (*Matteuccia struthiopteris*), hiirenporrasta, mesiangervoa sekä metsä- ja korpi-imarretta. Pohjakerros on aukkoinen ja koostuu lähinnä lehvasammalista uoman välittömässä läheisyydessä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID		125	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)	
Pinta-ala		15,96 ha	
Luontotyypit		Ruohokorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Varpukorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Muurainkorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste		Luokka I: Ennallistamiskelpoiset ojitetut lehtokorvet, lettokorvet, ruohokorvet, aitokorvet ja pohjavesivaikutteiset korvet	
Vesistön rantakasvillisuus on pääosin ruohokorpea, jonka seassa vaihtelee useina pieninä alueina mosaiikkimaisesti mustikka- ja muurainkorpea. Melkein koko alueella on tehty vähintään harsintahakkuita. Puusto on pääosin varttunutta kuusikkoa, mutta seassa on reilusti myös mäntyjä ja hieskoivuja. Kenttäkerroksessa ruohokorvessa on raatetta, viitakastikkaa, rentukkaa, kurjenjalkaa, lisäksi paikoin on suoputkea (<i>Peucedanum palustre</i>), rantamataraa (<i>Galium palustre</i>) sekä viiltosaraa (<i>Carex acuta</i>). Mustikka- ja muurainkorvissa kenttäkerroksessa on mustikkaa, muurainta, pallosaraa ja puolukkaa. Lajien runsaussuhteet vaihtelevat riippuen korpityypistä. Pohjakerroksessa valtalajina on kaikkialla korpilahkasammal, myös varvikkorahkasammalta ja korpikarhunsammalta on. Lisäksi alueella on paikoin hieman kalvakka- ja pallopäärahkasammalta (<i>Sphagnum wulfianum</i>). Lahopuuta on niukasti. Alueen lähistö on runsaasti ojitettua, ja alueen reunoilla kulkee oja kaikkialla.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
			



ID	126A–126T	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (aapasuot 7310) Vastuuluontotyyppi (aapasuot)	
Pinta-ala	76,82 ha	
Luontotyypit	Kes kiboreaaliset aapasuot, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Kohteet 126A–126T muodostavat yhdessä aapasuokokonaisuuden. Alueella on mm. lyhytkorsirämeitä, rimpinevarämeitä, rahkarämeitä, sararämeitä, kalvakkarämeitä sekä rimpinevoja. Varsinkin aapasuon pohjoispuolella on ojituksia, minkä vuoksi alueen vesitalous ei ole luonnontilaisen kaltainen. Eteläpuolella on kangasmaata sekä metsätie. Aapasuon alueella on lähde (alue 130), josta lähtee lähdepuro aapasuon alueelle.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	126A–126B
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,32 ha + 0,75 ha
Luontotyypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on sararämettä, jossa ei ole eläviä puita, vaan ainoastaan paljon keloja. Kenttäkerroksessa vallitsee pullosara, lisäksi alueella on riippasaraa, luhtavillaa ja raatetta. Pohjakerroksessa on sara- ja haprarahkasammalta. Alue on upottavaa ja rimpipintaista. Alueen ympärillä on joitain oja ja teitä. Näiden vuoksi alue vaihettuu aivan ojien vieressä kapeaksi kaistaleeksi isovarpurämettä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126C
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	16,54 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on sararimpinevaa, jossa ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa vallitsee pullosara, lisäksi alueella on riippasaraa, luhtavillaa ja raatetta. Pohjakerroksessa kasvaa sara- ja haprarahkasammalta. Alue on hyvin upottavaa ja rimpipintaista. Alueen lähistöllä on joitain oja ja teitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126D	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	3,35 ha	
Luontotyypit	Sarakorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste	Luokka I: Kaikki vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet	
Alue on sarakorpea, jonka puustossa on nuorta hieskoivua ja niukasti mäntyjä. Kenttäkerroksessa on runsaasti rimpipintoja, jossa on jouhi- ja pullosaraa. Lisäksi esiintyy luhtavillaa, raatetta, riippasaraa sekä paikoin vehkaa (<i>Calla palustris</i>) ja villapääluikkaa (<i>Trichophorum alpinum</i>). Mättäillä on suursarojen lisäksi vaivaiskoivua, siniheinää (<i>Molinia caerulea</i>), rahkasaraa sekä hieman suoputkea ja kurjenjalkaa. Pohjakerroksessa nevapinnoilla on paljon ruoppaa ja rimpipintaa sekä sararahkasammalta, mättäillä on mm. puna- ja hapa- ja lettorahkasammalta (<i>Sphagnum teres</i>). Paikoin alueella on pystyyn lahonneita koivuja, mutta kokonaisuudessaan alueen lahoppuusto jää alle 5 m³/ha. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojia, joten alueen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		



ID	126E
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	11,94 ha
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Laaja rimpineva-alue, jossa kasvaa hyvin harvakseltaan mäntyjä. Valtaosa männyistä on varttuneita. Kenttäkerroksessa on juurto- ja riippasaraa, valkopiirtoheinää (*Rhynchospora alba*), hieman pullosaraa, leväkköä, tupasvillaa, tupasluikkaa, raatetta sekä paikoitellen vaaleasaraa. Pohjakerroksessa kasvaa kurjen- ja paakkurahkasammalta. Nevaosuuksilla on runsaasti rimpipintoja ja ruoppaa, rimpipinnan peittäen yli puolet alasta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojia, joten alueen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
		

ID	126F
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	12,07 ha
Luontotyytit	Rimpinevarämet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on rimpinevarämettä, jossa on runsaasti mättäitä. Puusto on varttunutta männikköä, jossa on ikävaihtelua. Kenttäkerroksessa nevapinnalla esiintyy mm. mutasaraa, villapääluikkaa, valkopiirtoheinää, konnanliekoa (*Lycopodiella inundata*), luhtavillaa, leväkköä, tupasluikkaa, pullosaraa, raatetta sekä niukasti tähtisaraa. Mättäät ovat isovarpurämettä, ja niillä kasvaa mm. vaivaiskoivua ja juolukkaa. Lisäksi mättäillä on siniheinää. Pohjakerroksessa nevaosuuksilla on runsaasti ruoppaa ja rimpipintoja, lisäksi esiintyy mm. vajorahkasammalta. Kuviolla on jonkin verran keloja, mutta kokonaisuudessaan lahoppuun määrä jää pieneksi. Alueen lähellä ei ole ihmisen tekemiä oja, joten sen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	126G
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,35 ha
Luontotypit	Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Tupasvillarämettä, jossa kasvaa iältään vaihtelevaa, kitukasvuista männikköä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. tupasvillaa, muurainta, juolukkaa, vaivaiskoivua ja niukasti leväkköä. Pohjakerroksessa on lähinnä rämerahkasammalta. Alueen vieressä on ojituksia, jotka eivät kuitenkaan ole kuivattaneet suota.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126H	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,65 ha	
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Lyhytkorsirämettä, jossa kasvaa kitukasvuista männikköä. Lahopuuta ei ole. Mätäspintoja on runsaasti välipintojen lisäksi. Mättäillä kasvaa mm. kanervaa, variksenmarjaa ja suokukkaa, välipinnoilla taas tupasluikkaa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa on mm. ruskorahkasammalta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojituksia.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	126I	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	2,90 ha	
Luontotyytit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste	Luokka II: Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet	
Kuviolla on muutama nuori mänty pensaskerroksessa, mutta muuten alue on puutonta. Kenttäkerroksessa on leväkköä, raatetta, tupasluikkaa ja paikoin valkopiirtoheinää sekä runsaastikin jouhisaraa. Lisäksi esiintyy vaaleasaraa. Mättäillä on kanervaa, vaivaiskoivua ja muurainta. Pohjakerroksessa kasvaa paakku- ja vajorahkasammalta. Nevaosuuksilla on runsaasti rimpipintoja ja ruoppaa, rimpipintojen peittäen yli puolet alasta. Kuvion välittömässä läheisyydessä ei ole oja, joten sen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
		

ID	126J
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (luonnonmetsät 9010)
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (kangasmetsäsaarekkeet)
Pinta-ala	0,16 ha
Luontotyytit	Kuivat kankaat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on kapea kangasmaalaikku ojittamattoman suon keskellä. Puusto on varttunutta männikköä, jonka joukossa on joitain nuorempia sukupolvia sekä hieskoivuja. Kenttäkerroksessa on runsaasti variksenmarjaa, lisäksi esiintyy kanervaa, muurainta sekä matalia isovarpuja. Pohjakerroksessa on seinäsammalta ja kangaskynsisammalta. Vaikka alueella ei ole runsaasti arvokkaita erityispiirteitä, on sen puusto kuitenkin luonnontilaisen kaltaista. Lahopuuta kuviolla on muutaman vanhan kelon verran, joten lahopuuta on alle 5 m²/ha.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID		126K	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala		1,76 ha	
Luontotyytit		Kalvakkarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Puusto on harvaa männikköä, joka on pääosin nuorta. Seassa on kuitenkin myös varttuneita mäntyjä. Kenttäkerroksessa nevaosuuksilla on runsaasti valkopiirtoheinää. Mättäillä kasvaa muurainta, kanervaa, suopursua sekä juolukkaa. Pohjakerroksessa nevaosuuksilla on runsaasti rimpipintoja sekä ruoppaa, mutta rimpipinta ei peitä yli puolta alasta. Mättäillä kasvaa kalvaka-, paakku- ja kangasraikasammalta sekä seinäsammalta. Alueen lähellä ei ole ihmisen tekemiä ojia, joten sen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		B (hyvä)	A (luonnontilainen)
			

ID	126L
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,20 ha
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Rimpinevarämettä, jossa kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta on jonkin verran, lähinnä keloina. Alueella on mätäs-, väli- ja rimpipintojen vaihtelua. Mättäillä kasvaa kenttäkerroksessa mm. kanervaa ja variksenmarjaa, väli- ja rimpipinnoilla tavataan tupasluikkaa, valkopiirtoheinää ja suokukkaa. Alueen vieressä kulkee polku, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126M
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,15 ha
Luontotyytit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi

Rahkarämettä, jossa kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä, seassa on myös vanhoja mäntyjä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksen valtalaji on kanerva, lisäksi kasvaa mm. variksenmarjaa, suokukkaa, muurainta, tupasvillaa, juolukkaa, vaivaiskoivua ja suopursua. Pohjakerroksessa on rusko- ja rusorahkasammalta. Alueen vieressä kulkee polku, mutta vesitalous on säilynyt luonnontilaisena.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126N
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,12 ha
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Rimpinevarämettä, jossa kasvaa harvakseltaan mäntyjä lähinnä pensaskerroksessa, puustossa ei ole paljoakaan ikävaihtelua. Lahopuuta ei ole. Alueella on selkeiden mätäspintojen lisäksi väli- ja rimpipintoja. Kenttäkerroksessa valkopiirtoheinä on selkeä valtalaji, lisäksi kasvaa tupasluikkaa ja suokukkaa. Mättäillä kasvaa vaivaiskoivua, variksenmarjaa, juolukkaa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa on enimmäkseen ruskorahkasammalta mätäspinoilla. Alueen vieressä pari polkua, mutta vesitalous ei ole muuttunut merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	1260
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	9,19 ha
Luontotyytit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi
METSO-valintaperuste	Luokka II: Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet

Laaja rahkarämealue, jossa kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä. Seassa on myös vanhoja mäntyjä. Lahopuuta on kohtalaisesti lähinnä kelojuina. Mätäspintoja on hyvin runsaasti. Kenttäkerroksessa kasvaa kanervaa, variksenmarjaa, muurainta, tupasvillaa, vaivaiskoivua ja suokukkaa. Alueen läpi kulkee suon laidassa sijaitsevasta lähteiköstä (kohde 130) alkava lähdenor, jossa kasvaa runsaasti pullosaraa. Pohjakerroksen selkeä valtalaji on ruskorahkasammal. Alueen pohjoispuolella kulkee oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut vesitalouteen.

Arvoluokka**2, erityisen tärkeät kohteet****Edustavuus****B (hyvä)****Luonnontilaisuus****B (vähän heikentynyt)**



ID	126P
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,16 ha
Luontotypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Pieni sararämealue, jolla kasvaa niukasti mäntyjä. Puustossa ei ole juurikaan ikävaihtelua, lahoppua ei ole. Kenttäkerroksessa on rahkamättäiden lisäksi lähinnä pullosaraa sekä niukasti järvikortetta, tupasvillaa ja vaivaiskoivua. Alueen vieressä kulkee oja, mutta vesitalous on säilynyt ennallaan.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126Q	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	2,26 ha	
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Isovarpurämettä, jonka puusto koostuu kitukasvuisista männyistä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. suopursua ja juolukkaa, pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Alueen lähellä kulkee polku, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta kasvillisuuteen tai vesitalouteen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	126R
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	4,51 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on lyhytkorsirämettä, jonka puustossa on eri-ikäisiä mäntyjä, suurin osa puustosta on kuitenkin nuorta. Kuvion pohjoisosassa on muutamia hieskoivuja. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, rahkasaraa, raatetta, riippasaraa ja leväkköä. Mättäillä on muurainta, vaivaiskoivua ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa kasvaa sara- ja ruskorahkasammalta. Lahopuuta alueella on niukasti. Oja kulkee suon pohjoisosassa, ja puuston kasvu on alkanut hieman lisääntyä erityisesti ojan lähetyvillä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	126S
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,49 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lyhytkorsirämettä, jonka puusto on pääosin vartunutta ja paikoin melko harvaa. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, rahkasaraa ja leväkköä. Mättäillä kasvaa kanervaa, muurainta ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on mm. rusko-, rusko- ja vajorahkasammalta. Lahopuuta alueella on niukasti, keloja on muutama. Ojia ei ole suon välittömässä läheisyydessä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	126T	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,82 ha	
Luontotyytit	Kalvakkarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Alueen puustossa on eri-ikäisiä mäntyjä, jotka kasvavat melko harvassa. Kenttäkerroksessa on runsaasti valkopiirtoheinää, lisäksi tavataan leväkköä, tupasluikkaa, luhtavillaa, riippasaraa sekä niukasti raatetta. Pohjakerroksessa on mm. kalvakkarahkasammalta. Alueella on paljon rimpipintaoja ja ruoppaa. Ojia ei ole suon välittömässä läheisyydessä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID	127
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,03 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on saranevaa, jossa kasvaa hieman hieskoivuja kangasmaahan vaihtumisen vuoksi. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, tupasluikkaa, riippa-, jouhi- ja juurtosaraa, suokukkaa sekä juolukkaa. Vaikka jouhisaraa on melko runsaasti, lyhytkortisuus vallitsee. Pohjakerroksessa on kalvakkarahkasammalta. Alue on kangasmaan ja ojittamattoman suon välissä, mutta aivan suon vierestä kulkee metsätie.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	128
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,08 ha
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueella on muutamia varttuneita mäntyjä, alueen reunaosissa on koivuja. Kenttäkerroksessa on runsaasti siniheinää, jouhisaraa ja pohjanpajua (*Salix lapponum*). Pohjakerroksessa ei kasva mitään, vaan pohjakerros on kuivaa ruoppaa. Alue on kangasmaan ja ojittamattoman suon välissä, mutta aivan suon vierestä kulkee metsätie.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	129
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,03 ha
Luontotyytit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueella kasvaa sekä nuoria että varttuneita mäntyjä. Kenttäkerroksessa on suopursua sekä mustikkaa runsaasti, lisäksi kasvaa juolukkaa, pallosaraa, kanervaa ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa tavataan kangas- ja varvikkorahkasammalta sekä seinäsammalta. Alue sijaitsee ojittamattoman kangasmaan keskellä, joten vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	130
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (lähteet ja lähdesuot 7160)
Lakistatus	Vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen suojeltava vesiluontotyyppi Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (lähteiden välittömät lähiympäristöt)
Pinta-ala	5 m ²
Luontotyypit	Lähteiköt, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi
METSO-valintaperuste	Luokka I: Luonnontilaiset tai sen kaltaiset lähteiköt, lähdehetteet ja lähdepurot lähimetsineen

Suon laidassa sijaitseva lähteikkö, josta lähtee suon (kohde 126O) läpi kulkeva lähdenoro. Lähteikön ympärillä kasvaa jonkin verran kitukasvuisia mäntyjä enimmäkseen pensaskerroksessa. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. tupasvillaa, muurainta, variksenmarjaa, villapääluikkaa ja luhtavillaa. Pohjakerroksessa on hete- ja happrarahkasammalta, kinnassammalia (*Scapania* sp.) sekä rimpisirppisammalta (*Scorpidium revolvens*). Lähteikössä tai sen ympärillä ei ole merkkejä ihmisvaikutuksesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
1, lainsäädännöllä turvatut kohteet	A (erinomainen)	Huomioitu suoraan edustavuuden kriteeristössä





ID	131–247
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (aapasuot 7310) Vastuuluontotyyppi (aapasuot)
Pinta-ala	371,48 ha
Luontotypit	Keskiboreaaliset aapasuot, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kohteet 131–247 muodostavat yhdessä aapasuokokonaisuuden. Alueella on mm. lyhytkorsirämettä, isovarpurämettä ja rahkarämettä. Aapasuon ympärillä on ojituksia ja turvetuotantoalueita, joten sen vesitalous ei ole luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	131
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,32 ha
Luontotypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puustosta noin puolet on nuoria mäntyjä, puolet hieskoivuja. Pensaskerroksessa on männyn taimia. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat tupasvilla ja raate, lisäksi esiintyy mutasaraa, vaivaiskoivua ja muurainta. Pohjakerroksessa on räme-, puna- ja varvikkorahkasammalta. Suon reunoilla kulkee ojia, jotka ovat vaikuttaneet alueen vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)

ID	132
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,57 ha
Luontotypit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puustossa on eri-ikäisiä mäntyjä, joista suurin osa on kuitenkin nuoria. Kenttäkerroksessa vallitsevat vaivaiskoivu ja juolukka. Lisäksi vaihettumisesta johtuen esiintyy joitakin suursaroja. Pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Oja kulkee aivan suon vieressä ja on kuivattanut aluetta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	133
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,06 ha
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Puustossa on nuoria mäntyjä ja muutama hieskoivu. Myös pensaskerroksessa on männyn taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa raatetta, järvikortetta, mutasaraa, leväkköä, luhtavillaa, jouhisaraa sekä muutama pullosara. Jouhisara runsastuu alueen eteläreunaa kohti. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta. Ojia kulkee alueen lähetyvillä ja niiden vaikutuksesta alue on taimettunut.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	134
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,38 ha
Luontotyytit	Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on tupasvillarämettä, jonka puustossa on nuorta männikköä sekä muutamia hieskoivuja. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasvilla, lisäksi esiintyy vaivaiskoivua, muurainta, juolukkaa ja suokukkaa. Vaihtumisesta johtuen alueella on myös raatetta, joka lisääntyy etelään päin, sekä suursaroja alueen pohjoisrajalla. Pohjakerroksessa on räme-, puna- ja varvikkorahkasammalta sekä kangaskarhunsammalta. Suoalueen reunoilla kulkee ojia, ja myös pohjoisosan läpi kulkee oja. Alue on alkanut taimettumaan, ja varpuisuus on lisääntynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	135
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,58 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on puutonta saranevaa, jossa on muutama männyn taimi. Kenttäkerroksessa vallitsee pullosara, lisäksi on tupasvillaa, leväkköä, jouhisaraa sekä vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa kasvaa sararahkasammalta. Alueen pohjoisreunan lähellä kulkee oja, mutta alue ei ole kuivahtanut sen seurauksena.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	136
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	4,56 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsiräme, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on harvapuustoista lyhytkorsirämettä, jossa on muutamia nuoria mäntyjä puu- ja pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, rahkasaraa sekä suokukkaa. Mättäillä on muurainta sekä variksenmarjaa. Pohjakerroksessa esiintyy kurjen- ja rimpirahkasammalta (*Sphagnum annulatum*) sekä ruskorahkasammalmättäitä. Oja kulkee alueen kaakkoisreunalla, lisäksi yksi oja kulkee alueen läpi. Vesitalous ei silti näytä heikentyneen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	137
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,96 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on kapea vyöhyke isovarpurämettä tupasvillärämeen (alue 138) ja alueen lounaissivulla kulkevan ojan välissä. Alueen puustossa osa männyistä ovat nuoria ja osa varttuneita. Puusto on suhteellisen tiheää, ja seassa on muutama hieskoivu. Kenttäkerroksessa vallitsevat juolukka ja suopursu, myös pallosaraa ja variksenmarjaa esiintyy. Pohjakerroksessa on räme- ja varvikkorahkasammalta. Lounaissivun oja on kuivattanut aluetta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	138
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	3,91 ha
Luontotyytit	Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Tupasvillarämettä, jonka puustosta valtaosa on nuorta männikköä, ikävaihtelua esiintyy hieman. Kenttäkerroksessa tupasvillaa on runsaasti, lisäksi esiintyy pallosaraa. Mättäillä on variksenmarjaa ja muurainta. Pohjakerroksessa on varvikko- ja punarahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Ojia on varsinkin suon pohjoisosassa, missä myös mäntyjä on hieman runsaammin kuin muualla. Etelämmässä ojien vaikutusta ei huomaa.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	139
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	5,49 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on pääosin puutonta lyhytkorsirämettä, jossa on muutamia mäntyjä pääosin pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, rahkasaraa sekä märemmissä painaumuissa leväkköä. Mättäillä on muurainta ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on kurjenrahkasammalta ja ruskorahkasammalmättäitä. Oja kulkee alueen koillisreunassa, mutta vesitalous ei ole heikentynyt merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	140
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,98 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on harvapuustoista lyhytkorsirämettä. Männyt ovat nuoria ja melko matalia. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, rahkasaraa sekä mutasaraa, mättäillä on variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on punarahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Alueella on muutama pieni kelo. Oja kulkee alueen lounaisreunalla mutta ei ole kuivattanut suota merkittävästi.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	141
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,30 ha
Luontotyypit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Suoalue on muodostunut kangasmetsäsaarekkeelle. Alueen puusto on melko tasaikäistä nuorehkoa männikköä, seassa on myös muutama kuusi. Kenttäkerroksessa vallitsevat isovarvut, vaikka metsävarpujakin on runsaasti. Kenttäkerroksessa on suopursua, juolukkaa, pallosaraa, muurainta sekä puolukkaa. Pohjakerroksessa valtalaji on varvikkorahkasammal, lisäksi esiintyy kangasrahkasammalta ja niukasti seinäsammalta. Ojia ei ole alueen välittömässä läheisyydessä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	142
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,61 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Suoalue on saranevaa, jossa ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa on pullosaraa, raatetta ja paikoin runsaastikin leväkköä. Pohjakerroksessa on kalvaka-, rusko-, vajo- ja rimpilahkasammalta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	143
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	4,66 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Suoalue on puutonta ja pensaatonta lyhytkorsirämettä. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, leväkköä, riippasaraa ja pullosaraa. Mättäillä on muurainta, variksenmarjaa ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta, mättäillä on rusko- ja punarahkasammalta. Alueen eteläreunassa kulkee oja, mutta se ei ole vaikuttanut suon vesitalouteen aivan ojan vierustaa lukuun ottamatta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	144
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	6,65 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lyhytkorsirämettä, jonka puustossa nuori mänty on pääasiassa valtalajina. Paikoitellen myös hieskoivua on runsaasti. Myös pensaskerroksessa on männyn taimia. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, riippasaraa ja mutasaraa, mättäillä on vaivaiskoivua, variksenmarjaa sekä suokukkaa. Pohjakerroksessa esiintyy sara- ja rimpirahkasammalta, mättäillä on rusko- ja punarahkasammalta. Sekä suoaluetta ympäröivät ojat että alueen läpi kulkeva oja ovat kuivattaneet aluetta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	145
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,44 ha
Luontotyytit	Tupasvillakorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Puustossa vallitsevat nuoret hieskoivut. Koivut ovat satunnaisesti jakautuneita, mutta melko tasaikäisiä. Alueen pohjoisreunassa mäntyjen osuus puustossa kasvaa. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasvilla, lisäksi esiintyy niukasti muurainta, vaivaiskoivua ja suokukkaa. Alueen reunaosissa kenttäkerros on vähälajista, mutta keskellä tupasvilla runsastuu reilusti. Pohjakerroksessa on räme- ja varvikkorahkasammalta sekä niukasti rämekarhunsammalta. Lahopuuta alueella ei ole. Oja kulkee alueen itäreunassa, ja myös länsireunan lähetyvillä on oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnonalaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	146
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,63 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Puusto on harvassa kasvavaa nuorta männikköä. Myös pensaskerroksessa on männyn taimia. Kenttäkerroksessa on paljon tupasvillaa, lisäksi esiintyy jouhi- ja pullosaraa, vaivaiskoivua, raatetta ja muurainta. Vaikka tupasvillaa on runsaasti, jouhi- ja pullosara ovat hyvin vallitsevia alueella. Vaivaiskoivu ja muurain runsastuvat itäisiä oja kohti. Pohjakerroksessa on sara- ja rämerahkasammalta. Alueen itäreunalla kulkee oja, joka on kuivattanut varsinkin alueen itäosaa. Alue on myös hieman alkanut taimettumaan.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	147
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	2,33 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puusto koostuu pääosin harvassa kasvavista nuorista männyistä, seassa on myös muutama nuori hieskoivu. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasvillaa, rahka-, riippa- ja juurtosaraa. Pohjakerroksessa taas esiintyy puna-, räme- ja kalvakkarahkasammalta. Alueella on muutama laikku rimpinevaa, joissa kasvaa pääosin leväkköä, luhtavillaa ja suokukkaa. Oja kulkee alueen länsireunassa, mutta suoalue ei näytä kuivuneen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	148
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	8,37 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Minerotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Laaja ja avoin suoalue, jolla rimpi- ja saranevat sekä lyhytkorsinevat vuorottelevat. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. leväkköä, tupasluikkaa, suokukkaa ja pullosaraa. Alueen kaakkoispuolella kulkee oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut suon vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	149	
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,66 ha	
Luontotyypit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi	
Rahkarämettä, jossa kasvaa niukasti mäntyä. Lahopuuta ei ole. Mätäspintoja on runsaasti välipintojen lisäksi. Mättäillä kenttäkerroksessa kasvaa variksenmarjaa, muurainta ja suokukkaa, välipinnoilla tupasluikkaa, tupasvillaa ja leväkköä. Pohjakerroksessa on enimmäkseen ruskorahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähistöllä ole ojia.		
Arvaluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	150	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)	
Pinta-ala	0,49 ha	
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Rimpinevaa, jossa on runsaasti rimpipintaa välipintojen lisäksi. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. leväkköä, tupasluikkaa ja tupasvillaa. Pohjakerros koostuu rahkasammalista. Alueen vesitalous on luonnontilainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID		151
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)
Pinta-ala		0,48 ha
Luontotyytit		Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi
Alueella esiintyy vaihdellen rimpineva- ja lyhytkorsirämettä. Puusto koostuu melko harvakseltaan kasvavista kitukasvuisista männyistä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa vallitsevat tyypilliset lajit, kuten leväkkö ja tupasluikka. Pohjakerros koostuu tavallisista rahkasammalista. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä ojia tai muita merkkejä ihmistoiminnasta ole lähellä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID		152
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)
Pinta-ala		0,44 ha
Luontotyytit		Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi
Lyhytkorsirämettä, jossa kasvaa kitukasvuista männikköä. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. tupasluikkaa, leväkköä ja tupasvillaa. Pohjakerros koostuu tyypillisistä rahkasammalista. Kuvion vesitalous on luonnontilainen, eikä lähellä ole ojia.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	153
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	6,36 ha
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isohko suoalue, jolla rimpi- ja saraneva-alueet vaihtelevat. Saranevaa on keskimäärin enemmän reunaosissa, kun taas rimpinevaa esiintyy hieman yleisemmin alueen keskellä. Puustoa ei ole alueen reunaosia lukuun ottamatta. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksen valtalaji on saraneva-alueilla jouhisara, lisäksi kyseisillä alueilla esiintyy mm. tupasvillaa, raatetta, pullosaraa ja vaivaiskoivua. Rimpinevojen rimpipinnoilla esiintyy mm. leväkköä, suokukkaa, tupasluikkaa ja raatetta, mätäspinnoilla taas rahkasaraa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa esiintyy sara- ja punarahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, ainoastaan luoteiskulmassa on pari ojaa.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	154
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,56 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isovarpurämettä, jossa kasvaa riukumaista männikköä tiheästi. Puustossa ei ole ikävaihtelua, lahoppuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa kasvaa melko matalaa suopursua, variksenmarjaa, juolukkaa, vaivaiskoivua, pallosaraa ja muurainta. Pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Alueen läpi menee oja ja sen pohjoispuolella on moottorikelkkareitti.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	155	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,89 ha	
Luontotyypit	Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Tupasvillarämettä, jolla kasvaa ympäröiviä suoalueita enemmän mäntyjä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasvilla, lisäksi esiintyy mm. tupasluikkaa. Pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Kuvio rajautuu kahdelta sivultaan ojituksiin, mutta lajisto on säilynyt alueella muuttumattomana.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	156	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,53 ha	
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Tupasvillarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Alue on suurimmaksi osaksi rimpinevarämettä, jossa on erotettavissa rimpi-, väli- ja mätäspintojen vaihtelu. Lisäksi alueella on kuivemmissa kohdissa tupasvillarämettä. Mätäspinoilla kasvaa jonkin verran mäntyjä, lahopuuta ei juurikaan ole. Väli- ja rimpipinoilla kasvaa kenttäkerroksessa mm. tupasluikkaa, leväkköä ja raatetta, kuivemmillä alueilla lisäksi tupasvillaa. Pohjakerroksessa on mm. rämerahkasammalta. Alueen vieressä on yksittäinen oja, ja kuvion läpi kulkee moottorikelkkareitti. Lajisto on kuitenkin säilynyt luonteenomaisena.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	157
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	9,56 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Laaja ja avoin rimpineva-alue. Pensaskerroksessa kasvaa hyvin harvakseltaan mäntyjä. Kuviolla on selkeää rimpi-, väli- ja mätäspintojen vaihtelua. Kenttäkerroksessa kasvaa pullosaraa, tupasluikkaa, leväkköä, raatetta ja suokukkaa, kuivemmilla alueilla myös vaivaiskoivua. Rimpipinnoilla kasvaa lisäksi valkopiirtoheinää. Pohjakerroksessa esiintyy mm. rusko- ja rusorahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähellä ole ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)





ID		158–160	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi	
Pinta-ala		0,95 ha + 0,81 ha + 0,24 ha	
Luontotyypit		Minerotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Yksittäisiä pienehköjä lyhytkorsineva-alueita, joilla on ympäröiviä suoalueita vähemmän rimpipintoja. Kenttäkerroksessa on mm. tupasluikkaa ja tupasvillaa sekä niukasti suursaroja, pohjakerroksessa on rämerahkasammalta. Alueista isoimman vieressä kulkee oja, muiden alueiden lähellä ei ole merkkejä ihmisvaikutuksesta.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	161
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,29 ha
Luontotyytit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kangasrämettä, jossa kasvaa iältään hieman vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. juolukkaa, variksenmarjaa, suopursua, kanervaa, pallosaraa, puolukkaa, muurainta ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa esiintyy kangasrahkasammalta ja seinäsammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähistöllä ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	162
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,37 ha
Luontotyytit	Kuivahkot kankaat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kapea alue kuivahkoa kangasta suoalueiden välissä. Puusto koostuu melko samanikäisistä männyistä, seassa kasvaa myös kuusia ja niukasti koivuja. Lahopuuta on hyvin niukasti. Kenttäkerroksessa tavataan mm. puolukkaa, suopursua ja mustikkaa. Pohjakerroksessa kasvaa seinäsammalta. Alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	163	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi	
Pinta-ala	0,12 ha	
Luontotyypit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Pieni kangasrämealue, jolla kasvaa iältään hieman vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta ei juurikaan ole. Alueella on runsaasti mätäspintoja, joilla esiintyy mm. kanervaa ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on mm. rämerahkasammalta. Alueen lähistöllä ei ole ojituksia.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	164	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi	
Pinta-ala	0,53 ha	
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Pienialainen ja puuton saranevakuvio, jonka kenttäkerroksessa suursaroilla, kuten jouhi- ja pullosaralla, on valta-asema. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojia tai muitakaan ihmistoiminnan jälkiä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	165
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,34 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Lievästi luhtaista sararämettä, jonka puusto koostuu männyistä ja koivuista. Puustossa ei ole juurikaan ikävaihtelua, eikä lahoppua ole. Pensaskerroksessa esiintyy pajuja. Kenttäkerroksessa on suursaroja, raatetta, vaivaiskoivua, kurjenjalkaa ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa kasvaa mm. hapra- ja okarahkasammalta. Kuvion läpi kulkee moottorikelkkareitti. Alueen vesitalous on luonnontilainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	166
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	5,51 ha
Luontotyyppi	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Muutaman hehtaarin kokoinen sararämealue, jolla kasvaa niukasti kitukasvuisia mäntyjä. Puustossa on paikoin enemmän ikävaihtelua, myös vanhoja mäntyjä esiintyy siellä täällä. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksen valtalaji on jouhisara, lisäksi kasvaa mm. raatetta, kurjenjalkaa, vaivaiskoivua, järvikortetta ja suokukkaa. Mätäs-pinnoilla kasvaa variksenmarjaa ja vaivaiskoivua sekä niukasti juolukkaa ja suopursua. Pohjakerroksessa on mm. kurjen- ja kalvakkarahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen huolimatta melko suuresta ojasta juuri kuvion pohjoispuolella.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	167	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,57 ha	
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Kapea lyhytkorsirämekuvio, jossa kasvaa iältään niukasti vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta on on niukasti. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasluikkaa, rahkasaraa, variksenmarjaa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa tavataan rusko-, räme- ja punarahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä ojia ole lähettyvillä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	168
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,40 ha
Luontotyytit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kangasrämettä, jonka mäntyvaltaisessa puustossa on niukasti ikävaihtelua. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksessa kasva juolukkaa, suopursua, variksenmarjaa, tupasvillaa ja puolukkaa. Pohjakerroksessa on mm. kangas- ja rämerahkasammalta sekä seinäsammalta. Alueen vesitalous on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena pohjoispuolella kulkevasta isosta ojasta huolimatta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	169	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)	
Pinta-ala	0,66 ha	
Luontotyypit	Varpukorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO-valintaperuste	Luokka I: Kaikki vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet	
Alueen valtapuuna on kuusi, seassa on joitain mäntyjä ja hieskoivuja. Kuuset ovat pääasiassa varttuneita, mutta osa on myös nuoria. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa, pallosaraa, juolukkaa, suopursua ja muurainta. Suovarpuja on hieman vähemmän kuin metsävarpuja. Pohjakerroksessa on räme- ja varvikkorahkasammalta sekä korpikarhunsammalta. Alueella on niukasti lahoppuuta. Kuvio sijoittuu kangasmaan ja ojittamattoman suon väliin, joten sen vesitalous ei ole heikentynyt.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID	170	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,91 ha	
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Alue on isovarpurämettä, jonka puusto on pääosin nuorta männikköä, mutta seassa on myös muutama varttunut mänty. Lisäksi alueella on nuoria koivuja. Kenttäkerroksessa on juolukkaa, suopursua, vaivaiskoivua ja tupasvillaa. Viereisen kuvion vaihtumisesta johtuen suon reunaosissa on myös jouhisaraa. Pohjakerroksessa esiintyy räme- ja varvikkorahkasammalta. Lahopuuta on niukasti. Alue sijoittuu kangasmaan ja suon väliin. Kuvion eteläkärjen läheisyydessä on oja, mutta se ei ole kuivattanut suota.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	171
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)
Pinta-ala	1,12 ha
Luontotyytit	Varpukorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi
METSO-valintaperuste	Luokka I: Ennallistamiskelpoiset ojitetut lehtokorvet, lettokorvet, ruohokorvet, aitokorvet ja pohjavesivaikutteiset korvet

Alueen puusto koostuu pääasiassa varttuneista kuusista ja männyistä. Kuusia ja mäntyjä on suunnilleen saman verran. Lisäksi alueella on nuoria hieskoivuja. Pensaskerroksessa on hieskoivun ja pihlajan taimia. Kenttäkerroksessa on muurainta, mustikkaa, metsäkortetta, pallosaraa, puolukkaa sekä vähän korpikastikkaa. Muurainta ja mustikkaa on alueen länsiosassa enemmän, idässä metsäkorte vallitsee. Pohjakerroksessa on korpi- ja varvikkorahkasammalta sekä seinäsammalta puiden tyvillä. Lahopuuta on alueella niukasti. Alue sijoittuu kangasmaan ja suon väliin. Alueen eteläkärjen läheisyydessä on oja, mutta se ei ole kuivattanut suota.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	172–173
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	10,56 ha + 5,23 ha
Luontotypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueiden puusto on melko nuorta männikköä. Kenttäkerroksessa on pullo- ja jouhisaraa, tupasvillaa, raatetta sekä mutasaraa. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta sekä paikoin runsaastikin kalvakkarahkasammalta. Ojia kulkee lähellä alueiden reunoja, joten niiden vesitalous ei ole luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	174
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	7,89 ha
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on pääosin puutonta saranevan ja rimpinevan mosaiikkia. Siellä täällä on pienialaisia kohtia, joissa on muutama eri-ikäinen mänty. Myös pensaskerroksessa on siellä täällä männyn taimia. Kenttäkerroksessa on runsaasti jouhisaraa, lisäksi esiintyy pullosaraa, raatetta, leväkköä, vaivaiskoivua sekä hieman suoputkea ja kurjenjalkaa. Pohjakerroksessa on sara- ja punarahkasammalta. Suoalueen puolellavälissä on alueen reunassa oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut suurimpaan osaan alueesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	175
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	2,37 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on saranevaa, jossa ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa on pullo- ja jouhisaraa sekä tupasvillaa. Märemmissä painaumissa on lisäksi leväkköä ja raatetta. Pohjakerroksessa kasvaa sara- ja vajorahkasammalta. Noin 40 m:n päässä suosta kulkee oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut alueen vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	176
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,88 ha
Luontotyytit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on tupasvillärämettä, jonka eteläosa on hyvin rahkaista, lähes rahkarämettä, kun taas pohjoisosissa on paljon vaihtumista sararämeen puolelle. Puustossa kasvaa harvakseltaan pääosin nuoria mäntyjä, mutta seassa on myös muutama varttunut mänty. Myös pensaskerroksessa on männyn taimia. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, variksenmarjaa, matalaa juolukkaa sekä muurainta. Pohjakerroksessa kasvaa erittäin runsaasti ruskorahkasammalta varsinkin alueen eteläosassa, lisäksi kuviolla on räme-, puna- ja rusorahkasammalta. Alueen pohjoisosassa on vaihtumisesta johtuen hieman suursaroja, raatetta sekä sararahkasammalta. Oja kulkee aivan alueen länsirajalla ja se on hieman kuivattanut suota.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	177
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,16 ha
Luontotyytit	Mineotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on pääosin puutonta lyhytkorsinevaa, jossa on joitain männyn taimia pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa on tupasvillaa, rahkasaraa, tupasluikkaa, muurainta ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa esiintyy kurjen-, puna- rusko- sekä hieman kalvakkarahkasammalta. Oja kulkee suon länsipuolella ja sen seurauksena alue on alkanut lievästi taimettumaan.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	178	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	1,60 ha	
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Puutonta rimpinevaa, jossa on runsaasti jännerakenteita. Jännerakenteilla kasvaa matalia nuoria mäntyjä, moni männyistä on pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa on leväkköä, raatetta ja riippasaraa. Lisäksi jännerakenteilla esiintyy jouhisaraa, vaivaiskoivua ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa on sara- ja vajorahkasammalta sekä ruoppaa. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojituksia.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID	179
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	21,70 ha
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Sara- ja vajo-, rusko- ja punarahkasammalta

Alue on pääosin puutonta rahkasammalrampinevaa, jossa on sararimpinevalaikkua joukossa. Alueen pohjoisosissa on hieman enemmän mäntyjä ja mätäspintoja. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasluikkaa, raatetta, juurto-, riippa- ja harmaasaraa, luhtavillaa, valkopiirtoheinää sekä niukasti kurjenjalkaa ja leväkköä. Sararimpinevalaikuilla on leväkköä, raatetta sekä jouhi- ja pullosaraa. Rimpipinnoilla veden alla kasvaa rimpivesihermettä. Pohjakerroksessa on mm. sara-, vajo-, rusko- ja punarahkasammalta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	180
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,41 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Saranevaa, jonka pensaskerroksessa kasvaa muutamia mäntyjä ja koivuja. Kenttäkerroksen selkeä valtalaji on jouhisara, lisäksi esiintyy pullosaraa sekä niukasti siniheinää ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa on sara- ja kurjenrahkasammalta. Alueen vieressä kulkee iso oja, joka ei kuitenkaan ole muuttanut suon lajistoa tai vesitaloutta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (hieman heikentynyt)



ID	181	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi	
Pinta-ala	0,70 ha	
Luontotyypit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Kangasrämettä, jonka puusto koostuu iältään niukasti vaihtelevista männyistä. Lahopuuta ei juurikaan ole. Kenttäkerroksessa esiintyy suopursua, juolukkaa, variksenmarjaa, kanervaa ja puolukkaa. Alueen vesitalous on luonnontilainen, oja ei ole välittömässä läheisyydessä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (hieman heikentynyt)

ID	182
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	1,45 ha
Luontotyyppi	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Mesotrofista ruopparimpinevaa, jonka pensaskerroksessa kasvaa niukasti mäntyjä. Alueella on sekä rimpi- että välipintoja. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. raatetta, rahka- ja mutasaraa, tupasluikkaa, vaivaiskoivua, suokukkaa sekä niukasti luhtavillaa ja villapääluikkaa. Vedessä rimpipinnoilla esiintyy rimpivesihernettä (*Utricularia intermedia*). Alueen vieressä kulkee iso oja, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut suon lajistoon.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (hieman heikentynyt)



ID	183
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,29 ha
Luontotyytit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Rimpinevarämekuvio, jonka puusto koostuu kitukasvuisista männyistä ja koivuista. Lahopuuta ei ole. Alueella on enimmäkseen väli- ja mätäspintoja, rimpipintoja on vähemmän. Kenttäkerroksessa kasvaa vaivaiskoivua, tupasvillaa, suokukkaa ja tupasluikkaa. Pohjakerros koostuu tavanomaisista rahkasammalista. Kuvion vieressä kulkee iso oja, jonka vaikutuksesta alueen reunoilla on taimettumisen merkkejä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (hieman heikentynyt)



ID	184
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	3,48 ha
Luontotyytit	Kuivahkot kankaat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kuivahkoa kangasta, jonka puusto koostuu lähinnä tasaikäisistä, varttuneista männyistä. Seassa kasvaa myös kuusia sekä niukasti koivua. Lahopuuta on hyvin niukasti. Kenttäkerrosta valtaavat puolukka- ja mustikkavarvustot. Pohjakerroksessa on mm. seinäsammalta. Vaikka kuviolla itsessään ei ole kovin merkittäviä monimuotoisuudesta kertovia piirteitä, tuo se kangasmaana muutoin suovaltaiselle ympäröivälle alueelle monimuotoisuutta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)
		

ID	185
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	2,65 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Minerotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Saranevaa, jonka pensaskerroksessa kasvaa niukasti kitukasvuisia mäntyjä. Kenttäkerroksen selkeä valtalaji on jouhisara, lisäksi esiintyy mm. pullosaraa ja tupasvillaa. Siellä täällä on pienempiä alueita, joilla lyhytkortisuus vallitsee. Näillä kuvioilla esiintyy mm. tupasluikkaa. Myös rimpipintoja on vähän siellä täällä. Pohjakerroksessa on kalvakka- ja sararahkasammalta. Alueen lähellä ei ole ojituksia tai muita merkkejä ihmisvaikutuksesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	186
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,04 ha
Luontotyytit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Pieni ja puuton kalvakkanevakuvio, jonka kenttäkerroksen valtalaji on tupasluikka. Lisäksi esiintyy tupasvillaa, suokukkaa ja raatetta. Pohjakerroksessa kasvaa kalvakka- ja ruskorahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	187	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi	
Pinta-ala	3,39 ha	
Luontotyytit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Kalvakkanevaa, jonka pensaskerroksessa kasvaa niukasti mäntyjä. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasluikka, lähempänä kangasmetsän rajaa esiintyy hieman myös suursaroja. Pohjakerroksen valtalaji on kalvakkarahkasammal. Alueen vesitalous on luonnontilainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)

ID	188	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,32 ha	
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Suurin osa alueesta on mesotrofista sararimpinevarämettä, siellä täällä esiintyy myös sararämettä. Puusto koostuu iältään vaihtelevista männyistä, joiden joukossa on myös vanhoja yksilöitä. Lahopuuta ei juurikaan ole. Kenttäkerroksessa kasvaa järviruokoa, valkopiirtoheinää, raatetta ja jouhisaraa. Pohjakerroksessa on mm. ruskorahkasammalta. Alue rajautuu käsiteltyyn metsään, mutta sen vesitalous on luonnontilainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
		

ID	189	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)	
Pinta-ala	1,22 ha	
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Suurin osa alueesta on mesotrofista sararimpinevaa, siellä täällä esiintyy myös saranevaa. Mäntyjä on niukasti lähinnä pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. raatetta, valkopiirtoheinää, tupasluikkaa, pullosaraa, siniheinää ja leväkköä. Pohjakerroksessa on kalvaka- ja ruskorahkasammalta. Rimpipinnoilla veden alla kasvaa rimpivesihernettä. Alueen vesitalous on luonnontilainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)

ID	190	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,62 ha	
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Alue on mesotrofista sararämettä, jossa kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä. Myös vanhempia mäntyjä esiintyy. Lahopuuta on muutaman kelon verran. Rimpipintoja on siellä täällä. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. pullosaraa, luhtavillaa, vaivaiskoivua, valkopiirtoheinää, raatetta ja siniheinää. Pohjakerroksessa on mm. ruskorahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
		

ID	191
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,49 ha
Luontotyytit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on kalvakkanevaa, jossa kasvaa hyvin niukasti mäntyjä. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasluikka, jonka lisäksi kasvaa tupasvillaa sekä niukasti suursaroja, mätäspinnoilla esiintyy suokukkaa ja kanervaa. Pohjakerroksen valtalaji on kalvakkarahkasammal, mättäillä on ruskorahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	192
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,77 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lähes puutonta saranevaa, ainoastaan pensaskerroksessa esiintyy siellä täällä muutamia mäntyjä. Kenttäkerroksessa jouhisara on valtalaji, myös tupasluikkaa esiintyy runsaasti. Muita lajeja ovat mm. tupasvilla, leväkkö, rahkasara ja raate. Pohjakerroksessa on mm. sararahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähistöllä ole merkkejä ihmistoiminnasta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	193	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,24 ha	
Luontotyypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Sararämettä, jossa kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä. Myös vanhempia mäntyjä sekä muutamia keloja esiintyy. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. jouhisaraa, vaivaiskoivua ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa on ruskorahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
		

ID	194
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,28 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Puutonta saranevaa, jonka kenttäkerroksessa kasvaa hyvin runsaasti jouhisaraa, lisäksi mm. vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähistöllä ole merkkejä ihmisvaikutuksesta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	195
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,44 ha
Luontotyytit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lähes puutonta kalvakkanevaa, jonka kenttäkerroksessa esiintyy tupasvillaa, rahkasaraa, leväkköä, suokukkaa ja jouhisaraa. Pohjakerroksessa on kalvakka-, kurjen- ja punarahkasammalta. Lahopuuta on hyvin niukasti. Alueen vesitalous on luonnontilainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	196
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,62 ha
Luontotyytit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kangasrämettä, jonka puusto koostuu tasaikäisistä männyistä. Myös kuusia on seassa paljon, koivuja niukemmin. Mäntyjä kasvaa myös pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksessa esiintyy suopursua, juolukkaa, kanervaa, variksenmarjaa, puolukkaa, mustikkaa, pallosaraa ja muurainta. Pohjakerroksessa on mm. kangasraikasammalta ja seinäsammalta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	197
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,85 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueella on sararämettä, jonka puusto koostuu iältään jonkin verran vaihtelevista männyistä. Lahopuuta on niukasti, muutaman kelojuun verran. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat pullosara ja tupasvilla, lisäksi esiintyy mm. raatetta ja luhtavillaa. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta. Vesitalous on kuviolla luonnontilainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	198	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	1,24 ha	
Luontotyytit	Saraämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Rimpinevaraämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Alueella on suurimmaksi osaksi saraämettä, myös rimpinevaraämettä on siellä täällä jonkin verran. Mätäspinoilla kasvaa jonkin verran kitukasvuisia mäntyjä. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. pullo- ja jouhisaraa, mättäillä myös tupasvillaa, suokukkaa ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa kasvaa tavanomaisia rahkasammalia. Vesitalous on kuviolla luonnontilainen, eikä lähistöllä ole merkkejä ihmisvaikutuksesta.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)

ID	199
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	0,48 ha
Luontotyytit	Minerotrofiset lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN luontotyyppi)

Alue on puutonta lyhytkorsinevaa, jossa esiintyy myös rimpinevaa siellä täällä. Kenttäkerroksen selkeä valtalaji on tupasluikka, lisäksi esiintyy mm. tupasvillaa, leväkköä, suokukkaa ja niukasti pullosaraa. Pohjakerroksessa tavataan tavanomaisia rahkasammalia. Alueen vieressä, kuviorajauksen ulkopuolella kulkee iso oja, joka on kuivattanut suon reunaosia. Varsinaisella kuviolla vesitalous on kuitenkin säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	200	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	3,00 ha	
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Lyhytkorsirämettä, jonka puusto- ja pensaskerroksessa kasvaa kitukasvuisia mäntyjä. Lahopuuta on niukasti, lähinnä muutamia keloja. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasluikkaa, tupasvillaa, variksenmarjaa, vaivaiskoivua, mutasaraa, leväkköä, rahkasaraa sekä niukasti jouhi- ja pullosaraa. Pohjakerroksessa on mm. räme- ja kalvakkarahkasammalta. Kuvion ulkopuolella pohjoisosissa kulkee iso oja, joka on alkanut kuivattaa suota. Kuviolla vesitalous on sen sijaan säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	201
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,27 ha
Luontotyytit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Tupasvillärämekuvio, jolla kasvaa melko tasaikäisiä mäntyjä. Alueella on jonkin verran keloja. Kenttäkerroksen valtalaji on tupasvilla, lisäksi esiintyy niukasti mm. vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa esiintyy rämerahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen, eikä lähellä ole ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID		202	
Rajausperuste		Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suott)	
Pinta-ala		0,22 ha	
Luontotyypit		Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi	
Alue on rahkarämettä, jossa on varttunutta, matalaa männikköä. Metsänhoitotoimia ei ole tehty. Kenttäkerroksessa on variksenmarjaa, muurainta sekä hieman tupasvillaa. Pohjakerrosta peittää ruskorahkasammal. Alueella on noin viisi pientä keloä. Lähistöllä ei ole ojia tai muita kuivattavia tekijöitä.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
			

ID	203
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	3,00 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Sara-rämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on suurimmaksi osaksi lyhytkorsirämettä, jossa on runsaasti mätäspintoja. Kuvion pohjoisosissa on lisäksi siellä täällä sara-rämettä. Mättäillä kasvaa iältään vaihtelevaa männikköä, vanhoja mäntyjä ja keloja on jonkin verran. Kenttäkerroksen mätäspinoilla kasvaa kanervaa, vaivaiskoivua, muurainta ja variksenmarjaa, välipinoilla taas tupasluikkaa, tupasvillaa, rahkasaraa, leväkköä sekä pohjoisosissa pullosaraa. Pohjakerroksessa on mm. räme- ja punarahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)





ID	204	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	1,32 ha	
Luontotyytit	Saraameet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Alueen puusto on harvaa ja matalaa, keskittyen mättäille. Kenttäkerroksessa vallitsevat pullo- ja jouhisara, mättäillä on lisäksi variksenmarjaa. Siellä täällä esiintyy lyhytkortisia alueita, joissa on tupasluikkaa, tupasvillaa sekä rahkasaraa. Pohjakerroksessa kasvaa kurjen-, kalvakka- ja punarahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Alueen lähistöllä ei ole ojaia tai muita kuivattavia tekijöitä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID		205	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala		11,44 ha	
Luontotyytit		Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste		Luokka II: Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet	
Alue on lyhytkorsirämettä, jossa mättäiden osuus vaihtelee runsaista laajoista mättäistä alueisiin, joilla on pienempiä mättäitä ja nevaosuus hallitsevampi. Puusto on pääosin nuorta ja harvaa männikköä, mutta alueen keskiosassa puita on hieman runsaammin ja ne ovat vanhempia. Kenttäkerroksessa vallitsevat tupasluikka, tupasvilla ja rahkasara. Pohjakerroksessa on kurjen- ja punarahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Lähistöllä ei ole ojia tai muita kuivattavia tekijöitä.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet		B (hyvä)	A (luonnontilainen)
			

ID		206	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)	
Pinta-ala		10,27 ha	
Luontotyytit		Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste		Luokka II: Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet	
Alueen puusto on varttunutta männikköä, joka keskittyy pääosin mättäille. Kenttäkerroksessa on runsaasti pullo- ja jouhisaraa, lisäksi esiintyy rimpinevalaikkuja, joissa kasvaa leväkköä, tupasluikkaa, valkopiirtoheinää ja raatetta. Alueen pohjoisosassa on myös siniheinää. Mättäillä esiintyy vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa sararahkasammal on vallitsevin laji, lisäksi kasvaa puna-, kalvaka- ja rimpirahkasammalta. Mättäillä on myös varvikkorahkasammalta. Alueella on muutama kelo. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet		B (hyvä)	A (luonnontilainen)
			

ID	207–208
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	0,44 ha + 0,19 ha
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Saraimeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen männyt ovat vartuneita ja kasvavat melko harvassa. Kenttäkerroksessa on tupasluikkaa, leväkköä, valkopiirtoheinää sekä raatetta. Lisäksi esiintyy pieniä alueita, joilla on suursaroja. Pohjakerroksessa kasvaa kalvakka- ja vajorahkasammalta. Alueella on myös ruoppaa ja rimpipintaa. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	209	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,08 ha	
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Alueella on varttuneita mäntyjä, sekä muutama nuori hieskoivu. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat suopursu ja juolukka, lisäksi esiintyy tupasvillaa ja pallosaraa. Pohjakerroksessa on varvikkorahkasammalta. Alue sijoittuu kangasmaan ja ojittamattoman suon väliin. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID		210	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi	
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (kangasmetsäsaarekkeet)	
Pinta-ala		0,17 ha	
Luontotyytit		Kuivat kankaat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Puusto on pääosin varttunutta männikköä, mutta seassa on myös nuorempia mäntyjä. Kenttäkerroksessa vallitsee kanerva, lisäksi esiintyy variksenmarjaa, suopursua ja juolukkaa. Pohjakerroksessa on seinäsammalta sekä niukasti poronjäkäliä. Kangasmetsäsaareke sijaitsee ojittamattomalla suolla.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
4, monimuotoisuutta tukevat kohteet		C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
			

ID	211	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,23 ha	
Luontotyytit	Sara rämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Alue on sara rämettä, jossa on puuttomia mättäitä sekä hieman nuorta ja harvaa männikköä. Kenttäkerroksessa esiintyy pullo- ja jouhisaraa, suokukkaa sekä leväkköä, mättäillä on muurainta ja variksenmarjaa. Pohjakerroksen valtalaji on sara rahkasammal, lisäksi esiintyy puna- ja kalvakkarahkasammalta sekä muutamia ruskorahkasammalmättäitä. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID	212
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	2,08 ha
Luontotyytit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Kalvakkanevaa, jonka jännerakenteilla esiintyy kuitenkin muutamia varttuneita mäntyjä. Kenttäkerroksessa on tupasluikkaa, rahkasaraa, tupasvillaa, valkopiirtoheinää sekä paikoin jouhisaraa runsaasti. Pohjakerroksessa kasvaa mm. kalvakka- ja vajorahkasammalta. Alueella esiintyy lisäksi ruoppaa, rimpipintoja sekä rimpivesihernettä. Alueella on muutama kelo. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilaisuus)



ID		213	
Rajausperuste		Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus		Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala		0,69 ha	
Luontotyytit		Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Alueen puusto on varttunutta, pääosin harvaa ja matalaa männikköä. Kenttäkerroksessa esiintyy leväkköä, tupasluikkaa, tupasvillaa, rahkasaraa sekä valkopiirtoheinää. Pohjakerroksessa on mm. rusorahkasammalta. Alueella on myös joitain rimpipintoja, joiden kasvillisuus vastaa rimpinevaa. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.			
Arvoluokka		Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet		B (hyvä)	A (luonnontilainen)
			

ID	214
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	6,26 ha
Luontotyypit	Kalvakkanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on kalvakkanevaa, jossa ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasluikkaa, mutasaraa, raatetta ja pitkälehtikihokkia (*Drosera anglica*). Pohjakerroksessa on kalvakka- ja vajorahkasammalta sekä pieniä ruskorahkasammalmättäitä. Lähistöllä ei ole ojia tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)



ID	215
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,79 ha
Luontotyytit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on varttunutta, eri-ikäistä männikköä. Kenttäkerroksessa on matalaa suopursua ja juolukkaa, lisäksi esiintyy reilusti kanervaa ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa kasvaa varvikkorahkasammalta. Lahopuuta on alueella vain niukasti. Lähistöllä ei ole ojia tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	216
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	2,27 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Sararimpinevaa, jossa puustoa on hyvin vähän, pääosin mättäillä. Puusto on varttunutta männikköä. Kenttäkerroksessa vallitsevat pullo- ja jouhisara, myös lyhytkorsinevaa ja rimpipintaakin esiintyy runsaasti. Pohjakerroksessa on sara- ja kalvakkarahkasammalta. Alueella on muutama kelo. Lähistöllä ei ole ojia tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	217
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,72 ha
Luontotyypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puusto on varttunutta männikköä, jossa on hieman ikävaihtelua. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasvillaa, jouhisaraa, pullosaraa, vaivaiskoivua sekä suopursua. Pohjakerroksessa on varvikko- ja punarahkasammalta. Alue sijaitsee suon ja kangasmaan välissä, joten alueella on paljon vaihtumisesta johtuvaa lajistopoikkeamaa. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	218
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	21,15 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Rimpinevaa, jonka mätäspinoilla kasvaa muutamia varttuneita mäntyjä. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasluikkaa, valkopiirtoheinää, raateta, tupasvillaa sekä muutama pullosara. Pohjakerroksessa on kalvakka-, rimpi- ja vajorahkasammalta sekä muutamia ruskorahkasammalmättäitä. Lisäksi alueella on laajoja vesipintoja, ruoppaa sekä rimpivesihernettä. Lähistöllä ei ole ojia, mutta alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	219	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	12,36 ha	
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO- valintaperuste	Luokka II: Vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset muut rämeet	
Lyhytkorsirämettä, jossa on siellä täällä rimpinevalaikkuja seassa. Alueen puusto on matalaa ja harvaa männikköä. Kenttäkerroksessa on rahkasaraa, tupasvillaa sekä leväkköä, mättäillä kasvaa variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on mm. kalvakka- ja rimpirahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Alueen vesitalous on säilynyt luonnontilaisena.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	A (erinomainen)	A (luonnontilainen)
		

ID	220
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,37 ha
Luontotyypit	Pallosararämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on vaihettumista isovarpurämeen (alue 221) ja lyhtkorsirämeen (alue 219) välillä. Puustossa on pääosin nuoria mäntyjä, seassa on myös muutama vanhempi mänty. Kenttäkerroksessa on pallosaraa runsaasti, lisäksi esiintyy tupasvillaa, varikenmarjaa ja kanervaa. Pohjakerrosta peittää varvikorahkasammal, puiden juurilla on myös niukasti seinäsammalta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	221
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,35 ha
Luontotypit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Isovarpurämettä, joka sijaitsee kangasmaan ja ojittamattoman suon välissä. Puusto on pääosin nuorta ja melko tiheää männikköä. Alueen keskellä kulkee vanha ajoura. Kenttäkerroksessa kasvaa suopursua, juolukkaa, muurainta, kanervaa ja pallosaraa. Pohjakerroksessa vallitsevat räme- ja varvikkorahkasammal. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	222
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,96 ha
Luontotyyppi	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on rimpinevarämettä, jossa on mättäitä, mutta puita on melko harvassa. Puusto on varttunutta männikköä. Kenttäkerroksessa vaihtelevat sararimpineva- sekä rahkasammalrimpineva-alueet. Rahkasammalrimpinevalla on tupasvillaa, rahkasaraa sekä tupasluikkaa, sararimpinevalla on lisäksi pullo- ja jouhisaraa. Mättäillä on variksenmarjaa ja suokukkaa. Pohjakerroksessa esiintyy kalvakka- ja rimpirahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID	223
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,37 ha
Luontotyytit	Tupasvillärämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puustossa on nuoria mäntyjä. Viereisellä kangasmaalla on tehty hakkuita, ja myös tältä alueelta on muutama puu hakattu. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasvillaa, kanervaa, matalaa suopursua sekä pallosaraa. Tupasvilla vallitsee, mutta kanervaa on myös runsaasti, sillä alue on vaihettumisvyöhykettä kangasmaasta lyhytkorsirämeeseen (alue 219). Pohjakerroksessa on varvikko-, rusko- ja rusorahkasammalta ja hieman seinäsammalta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole ojia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (vähän heikentynyt)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	224
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,38 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueen puusto on melko harvaa, varttunutta männikköä. Seassa on myös joitain nuorempia mäntyjä. Alue rajautuu pohjoisessa käsiteltyyn kangasmaahan. Kenttäkerroksessa esiintyy tupasvillaa, matalaa vaivaiskoivua ja juolukkaa, rahkasaraa, pallosaraa, suokukkaa, tupasluikkaa sekä leväkköä. Pohjakerroksessa on nevapinnalla kalvakka-, sara- ja rimpirahkasammalta. Mättäillä kasvaa varvikko-, rusko- ja punarahkasammalta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	225
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	0,77 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on rimpinevaa, jossa ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa vaihtelevat sararimpineva- ja rahkasammalrimpineva-alueet. Rahkasammalrimpinevalla on tupasvillaa, rahkasaraa sekä tupasluikkaa, sararimpinevalla on lisäksi pullo- ja jouhisaraa. Pohjakerroksessa kasvaa kalvaka- ja rimpirahkasammalta. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	226
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,70 ha
Luontotyytit	Kalvakkarämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on kalvakkarämettä, jossa kasvaa harvakseltaan sekä varttuneita että nuoria mäntyjä. Kenttäkerroksessa esiintyy rahkasaraa, tupasvillaa, leväkköä, raatetta, tupasluikkaa sekä hieman pullosaraa. Mättäillä on vaivaiskoivua ja suokukkaa. Pohjakerroksessa esiintyy kalvaka- ja punarahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Alueella on myös muutamia rimpilaikkuja. Lähistöllä ei ole ojia tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	227
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	2,16 ha
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Saranevaa, jolla kasvaa vain muutama yksittäinen varttunut mänty. Kenttäkerroksessa on runsaasti pullo- ja jouhisaraa, lisäksi esiintyy tupasvillaa ja leväkköä. Seassa on hieman rimpinevaa. Pohjakerroksen valtalaji on kalvakkarahkasammal, lisäksi kasvaa puna- ja sararahkasammalta. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	228
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,69 ha
Luontotyytit	Lyhytkorsinevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on lyhytkorsinevaa, jossa ei ole puita tai pensaita. Kenttäkerroksessa on rahkasaraa, tupasvillaa, leväkköä, hieman pullosaraa, raatetta sekä tupasluikkaa. Pohjakerroksessa kasvaa kalvakka- ja punarahkasammalta. Lähistöllä ei ole oja tai muita kuivattavia tekijöitä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)



ID	229
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	2,67 ha
Luontotypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puusto on pääosin nuorta männikköä, jossa on myös vanhempia mäntyjä joukossa. Kenttäkerroksessa on runsaasti jouhisaraa, lisäksi esiintyy vaivaiskoivua, juolukkaa, tupasvillaa ja raatetta. Pohjoisessa tupasvilla ja vaivaiskoivu lisääntyvät. Pohjakerroksessa valtalajeina vaihtelevat sara- ja kalvakkarahkasammal, myös punarahkasammalta esiintyy. Alueen pohjoisosan lähellä on oja ja siellä puiden kasvu on hieman lisääntynyt.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	230
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	45,99 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on mesotrofista rimpinevaa, jossa on vain yksittäisiä mäntyjä ja pensaskerroksessakin esiintyy vain muutamia männyn taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa välipinnalla mm. tupasluikkaa, raatetta, suursaroja, suokukkaa ja luhtavillaa. Alueen itäosissa kasvaa myös siniheinää. Rimpipinnoilla tavataan mm. leväkköä, kurjenjalkaa, valkopiirtoheinää ja mutasaraa. Vedessä kasvaa rimpivesihernettä. Pohjakerroksessa on mm. kalvakka- ja kurjenrahkasammalta. Aivan alueen pohjoisosan lähistöllä on joitakin ojituksia, mutta alue on niin laaja, ettei sen vesitalous ole muuttunut. Lisäksi alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen arvokkaat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	231
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	0,42 ha
Luontotyytit	Kuivat kankaat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi
METSO-valintaperuste	Luokka II: Varttuneet ja uudistuskypsät kuivahkon ja kuivan kankaan metsiköt, joiden puusto on uudistunut luontaisesti ja on erirakenteista

Kangasmaalaikku suon reunalla. Puusto on eri-ikäistä männikköä, myös aiemman sukupolven puita esiintyy. Kenttäkerroksessa vallitsevat kanerva ja variksenmarja, lisäksi kasvaa niukasti juolukkaa. Pohjakerroksessa on seinäsammalta. Lahopuuta on alueella vain niukasti. Alueen pohjoisreunan lähellä kulkee oja.

Arvoluokka**4, monimuotoisuutta tukevat kohteet****Edustavuus****B (hyvä)****Luonnontilaisuus****B (vähän heikentynyt)**

ID	232
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,60 ha
Luontotyypit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Lyhytkorsirämettä, jossa on paljon mättäitä ja puita vain harvassa. Puusto on pääosin varttunutta matalaa männikköä. Kenttäkerroksessa on tupasluikkaa sekä tupasvillaa, mättäillä kasvaa variksenmarjaa. Pohjakerroksessa esiintyy kurjen- ja rusorahkasammalta sekä ruskorahkasammalmättäitä. Ruskorahkasammalmättäitä on varsinkin alueen koillisosassa runsaasti. Alueen pohjoispuolella on ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	233
Rajausperuste	Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,72 ha
Luontotypit	Rahkarämeet, joka on säilyvä (LC) luontotyyppi

Alueen puusto on melko harvaa, varttunutta männikköä. Kenttäkerroksessa kasvaa kanervaa, tupasvillaa sekä variksenmarjaa. Pohjakerroksessa on lähes yksinomaan ruskorahkasammalta, lisäksi esiintyy niukasti rusorahkasammalta sekä poronjäkäliä (*Cladonia* sp.). Alueen pohjoispuolella on ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	234
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,71 ha
Luontotyypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueella on eri-ikäisiä mäntyjä, jotka kasvavat melko harvassa. Kenttäkerroksessa on jouhisaraa sekä vähän pullosaraa, tupasluikkaa, siniheinää sekä vaivaiskoivua. Pohjoisosassa vaivaiskoivut ja mätäspinta runsastuvat. Pohjakerroksessa esiintyy kalvakka-, puna- ja varvikkorahkasammalta. Alueella on myös hieman rimpipintoja. Alueen pohjoispuolella on ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	235
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,12 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Isomman suoalueen reunaosissa esiintyvää mesotrofista sararämettä, jossa kasvaa suurimmaksi osaksi kookkaita ja varttuneita mäntyjä. Myös koivuja esiintyy runsaasti. Puustossa on jonkin verran ikävaihtelua, lahoppuuta ei kuitenkaan ole. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. jouhi- ja pullosaraa, vaivaiskoivua, siniheinää ja raatetta. Pohjakerroksessa kasvaa mm. rämerahkasammalta. Alueen vieressä on ojituksia, joiden vuoksi puuston kasvu vaikuttaa hieman lisääntyneen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		



ID	236
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	3,68 ha
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Mesotrofista rimpinevaa, jonka harvoilla mätäspinoilla kasvaa niukasti mäntyjä. Alueella on muutamia keloja. Kenttäkerroksen mätäspinoilla kasvaa vaivaiskoivua, kanervaa ja suokukkaa. Välipinoilla esiintyy tupasluikkaa, jouhisaraa, siniheinää ja luhtavillaa. Yleisillä rimpipinoilla kasvaa leväkköä, raatetta, mutasaraa, valkopiirtoheinää ja rimpivesihernettä. Pohjakerroksessa on mm. sararahkasammalta. Alueen vesitalous on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena pohjoisosassa olevista ojista huolimatta.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	237
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	1,13 ha
Luontotyytit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Kapealla alueella sijaitsevaa, lähes puutonta rimpinevaa, muutamia pieniä mäntyjä kasvaa pensaskerroksessa. Kenttäkerroksen valtalaji on kuvion pohjoisosissa siniheinä, eteläosissa taas tupasluikka. Lisäksi esiintyy mm. vaivaiskoivua. Aukkoisessa pohjakerroksessa kasvaa mm. sararahkasammalta. Alueen vieressä on kangasmaalaikku, jossa on taimikkoa ja ojituksia. Vesitalous kuviolla on kuitenkin säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)





ID	238	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (kangas- ja aitokorvet)	
Pinta-ala	0,31 ha	
Luontotyypit	Metsäkortekorvet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
METSO-valintaperuste	Luokka II: Ennallistamiskelpoiset ojitetut korvet, joiden puustossa on luonnontilaisuuteen liittyviä rakennepiirteitä (luontainen uudistuminen, erirakenteisuus, lahoppuistoisuus tai sekapuustoisuus) tai niissä on korpilajistoa jäljellä	
Alue on kangasmaiden väliin syntynyttä metsäkortekorpea. Puustossa vallitsevat nuoret kuuset. Kenttäkerroksessa on runsaasti metsäkortetta ja mustikkaa, lisäksi esiintyy niukasti juolukkaa, puolukkaa sekä tupasvillaa. Pohjakerrosta vallitsee korpilahkasammal. Lahoppuuta on alueella niukasti. Oja kulkee alueen luoteisosan lähistöllä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)
		

ID	239–240
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	6,29 ha + 0,16 ha
Luontotyytit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puustossa on varttunutta mäntyä sekä nuoria hieskoivuja. Pensaskerroksessa on mm. katajaa. Kenttäkerroksessa esiintyy jouhisaraa, siniheinää, tupasluikkaa, juolukkaa, raatetta, suoputkea sekä kurjenjalkaa. Pohjakerroksen valtalaji on sararahkasammal, paikoin esiintyy myös kalvakkarahkasammalta. Alueella on paljon rimpipintoja sekä rimpivesihernettä. Alueen eteläpuolella n. 40 metrin päässä on oja, lisäksi aivan alueen luoteisosan läpi kulkee oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	241
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0) Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	14,89 ha
Luontotyypit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alue on saranevaa, jossa on hyvin harvakseltaan matalia mäntyjä ja muutamia hieskoivuja. Kenttäkerroksessa on pullo- ja jouhisaraa, siniheinää, kurjenjalkaa, vaivaiskoivua sekä raatetta. Seassa on hieman rimpinevalaikkua, joilla kasvaa mm. tupasluikkaa ja leväkköä. Pohjakerroksen valtalaji on kalvakkarahkasammal, lisäksi esiintyy sararahkasammalta. Alueen länsireunan lähellä on muutamia oja, jotka eivät kuitenkaan vaikuta suon vesitalouteen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (vähän heikentynyt)	B (vähän heikentynyt)



ID	242	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Lakistatus	Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot)	
Pinta-ala	0,23 ha	
Luontotyytit	Saraämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Saraämettä, jossa on mätäspintoja, mutta puita on melko vähän. Harva puusto koostuu varttuneista männyistä. Kenttäkerroksessa esiintyy pullo- ja jouhisaraa sekä tupasvillaa. Mättäillä on muurainta sekä variksenmarjaa. Pohjakerrosta vallitsee saraäkasammal, jonka lisäksi esiintyy ruskoräkasammalmättäitä. Lähistöllä ei ole ojaia tai muita suota kuivattavia tekijöitä.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	A (luonnontilainen)
		

ID	243
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,40 ha
Luontotyytit	Kangasrämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puusto on varttunutta männikköä, jossa on myös nuorempia mäntyjä seassa. Kenttäkerroksessa kasvaa suopursua, juolukkaa, kanervaa, variksenmarjaa, tupasvillaa sekä pallosaraa. Pohjakerroksessa on varvikkorahkasammalta. Lahopuuta alueella on niukasti. Kuvio sijoittaa suon ja kangasmaan väliin. Aivan alueen eteläreunan lähellä on oja.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	244
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi
Pinta-ala	1,91 ha
Luontotyytit	Saranevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alue on saranevaa, jossa on vain yksittäisiä mäntyjä puu- ja pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa on runsaasti jouhisaraa, lisäksi esiintyy vaivaiskoivua ja raatetta. Pohjakerroksessa on sararahkasammalta. Myös rimpipintoja ja ruoppaa esiintyy, mutta niiden peittävyys on alle 1/5. Alueen eteläosan lähellä on ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	245
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,63 ha
Luontotyypit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueen puusto on nuorta männikköä, jonka seassa on muutamia hieskoivun taimia. Kenttäkerroksen valtalaji on jouhisara, myös viitakastikkaa ja luhtaisuudesta kielivää kurjenjalkaa on runsaasti. Pohjakerroksessa on mm. sararahkasammalta. Alueen luoteisreunassa kulkee oja, joka on kuivattanut aluetta. Tämän seurauksena alue on alkanut paikoin taimettumaan ojan vierestä.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	246–247
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Vastuuluontotyyppi (rimpinevat)
Pinta-ala	6,67 ha + 5,68 ha
Luontotyypit	Rimpinevat, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Alueet ovat puutonta ja pensaatonta rimpinevaa, jossa rahkasammalrimpinevan keskellä kulkee suursaravaltaisia jänteitä. Kenttäkerroksessa on raatetta, leväkköä, järvikortetta sekä suokukkaa. Jännerakenteilla esiintyy jouhisaraa, siniheinää ja vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa kasvaa kalvakka- ja punarahkasammalta. Lisäksi alueilla on rimpivesihernettä. Alueiden luoteisreunan lähetyillä on ojituksia.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	248
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,37 ha
Luontotyypit	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Alueella on on tasaikäistä varttunutta männikköä sekä muutama nuori kuusi. Kenttäkerroksessa kasvaa juolukkaa, suopursua ja mustikkaa. Pohjakerrosta peittää varvikkorahkasammal. Alueen eteläreunan lähellä on vanhoja oja, joten vesitalous ei ole luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	C (kohtalainen)	B (vähän heikentynyt)



ID	249A–249E	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (aapasuot 7310) Vastuuluontotyyppi (aapasuot)	
Pinta-ala	22,20 ha	
Luontotyypit	Kes kiboreaaliset aapasuot, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi	
Kohteiden 249A–249E muodostama aapasuokokonaisuus Epäilyksensuolla. Alueella on mm. lyhytkorsirämettä, isovarpurämettä ja rahkarämettä. Aapasuon ympärillä on ojituksia ja turvetuotantoalueita, joten sen vesitalous ei ole luonnontilaisen kaltainen.		
Arvaluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
2, erityisen tärkeät kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	249A
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	14,42 ha
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Epäilyksensuon hankealueen sisälle rajautuva alue, jolla on suurimmaksi osaksi mesotrofista sararimpinevarämettä. Lisäksi siellä täällä on pienempiä sararämealueita. Alueella on selkeitä jännerakenteita, joilla kasvaa iältään niukasti vaihtelevia mäntyjä. Mäntyjä on runsaasti myös pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Jännerakenteiden välissä on runsaasti rimpipintoja. Kenttäkerroksessa kasvaa väli- ja rimpipinnoilla villapääluikkaa, mutasaraa, leväkköä, raatetta, juurto- ja jouhisaraa sekä luhtavillaa. Jänneillä esiintyy vaivaiskoivua ja suokukkaa. Vedessä kasvaa myös rimpivesihernettä. Pohjakerros on aukkoinen ja keskittynyt jännerakenteille, joilla kasvaa mm. ruskorahkasamalta. Iso oja rajaa aluetta lähes joka puolelta, ja reunoilla on tapahtunut ojasta johtuvaa kuivumista. Alue on kuitenkin niin laaja, ettei vaikutus yllä reunaa pidemmälle.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	249B
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	4,63 ha
Luontotyypit	Rimpinevarämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Epäilyksensuon länsireunaa, jolla esiintyy mesotrofista rakkasammalrimpinevarämettä. lältään niukasti vaihtelevista männyistä koostuva puusto on keskittynyt jännerakenteille. Lahopuuta ei ole. Jännerakenteiden välissä on väli- ja rimpipintoja, joiden kenttäkerroksessa esiintyy mm. tupasluikkaa, mutasaraa, juurtosaraa, raatetta, villapääluikkaa ja luhtavillaa. Jännteillä kasvaa vaivaiskoivua ja suokukkaa. Pohjakerroksessa on mm. ruskorakkasammalta. Alueen vieressä kulkee oja, joka on kuivattanut rajatun alueen ulkopuolella olevia alueita.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	249C
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	0,67 ha
Luontotyytit	Sararämeet, joka on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi

Epäilyksensuon lounaiskulmassa sijaitseva kapea sararämealue, jolla kasvaa harvakseltaan iältään hieman vaihtelevaa männikköä. Lahopuuta ei ole. Alueella on enimmäkseen mätäs- ja välipintoja. Jouhisara on selkeä valtalaji välipinnalla, lisäksi esiintyy mm. raatetta. Mätäspinoilla kasvaa runsaasti vaivaiskoivua. Pohjakerroksessa on mm. kurjen- ja ruskorahkasammalta. Alueen vieressä kulkee oja, mutta lajisto ei ole muuttunut.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)



ID	249D	
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)	
Pinta-ala	0,84 ha	
Luontotyytit	Lyhytkorsirämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi	
Epäilyksensuolla sijaitsevaa lyhytkorsirämettä. Puusto koostuu iältään niukasti vaihtelevista männyistä, joita on erityisesti pensaskerroksessa. Lahopuuta ei ole. Alueella on mätäs- ja välipintojen vaihtelua. Mättäiden kenttäkerroksessa esiintyy mm. vaivaiskoivua ja suokukkaa, välipinnoilla taas tupasluikkaa, luhtavillaa, raatetta ja mutasaraa. Pohjakerroksessa on mm. ruskorahkasammalta. Melko lähellä aluetta kulkee oja, joka ei kuitenkaan ole kuivattanut suoaluetta.		
Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

ID	249E
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (puustoiset suot 91D0)
Pinta-ala	1,36 ha
Luontotyyppi	Isovarpurämeet, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Epäilyksensuon lounaisnurrassa esiintyvää isovarpurämettä, jonka puusto koostuu lähes yksinomaan tasaikäisistä, tiheään kasvavista männyistä. Lahopuuta ei ole. Pensaskerroksessa on mäntyjä ja koivuja hyvin niukasti. Kenttäkerroksen selkeä ja runsas valtalaji on vaivaiskoivu, lisäksi esiintyy mm. raatetta, kurjenjalkaa, suokukkaa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa kasvaa mm. sararahkasammalta. Alueen vieressä kulkee ojia, joiden vaikutuksesta alueella on tapahtunut taimettumista.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	D (heikko)	C (heikentynyt)



ID	250
Rajausperuste	Uhanalainen luontotyyppi Luontodirektiivin liitteen I luontotyyppi (vaihtelutissuot ja rantasuot 7140)
Pinta-ala	0,15 ha
Luontotyytit	Luhtanevat, joka on vaarantunut (VU) luontotyyppi

Hankealueelle suunnitellun liityntäjohtoon paikan lounaisosissa sijaitsevaa puutonta luhtanevaa. Pensaskerroksessa kasvaa koivuja sekä niukasti pajuja. Kenttäkerroksen valtalaji on pullosara, lisäksi kasvaa mm. tupasluikkaa, kurjenjalkaa, jousivihvilää, suoputkea sekä luhtavillaa. Pohjakerroksessa on mm. sararahkasammalta. Alueen vesitalous on luonnontilaisen kaltainen.

Arvoluokka	Edustavuus	Luonnontilaisuus
3, monimuotoisuutta turvaavat kohteet	B (hyvä)	B (vähän heikentynyt)

