

Rusovanukka

Rosa jordskinn

Amylocorticium subincarnatum

Uhanalaisuusluokka (IUCN): vaarantunut (VU)

Uhanalainen (LSA 521/2021)

Luonnehdinta

Rusovanukan yksivuotinen itiöemä on ohut ja melko pehmeä. Nuoret itiöemät ovat kellertäviä, mutta vanhemmiten väri muuttuu punertavaksi. Kasvuvaiheessa olevien itiöemien reuna säilyy kuitenkin kellertävänä. Rusovanukka muistuttaa hyvin paljon silmälläpidettävää rikkivanukkaa (*Amylocorticium subsulphureum*), ja tärkein lajit erottava tuntomerkki on itiöiden pituus.

Elinympäristö ja levinneisyys

Rusovanukka kasvaa vanhoissa metsissä järeissä havumaa-puissa, jotka ovat usein kuorettomia. Itiöemät muodostuvat rungolle kuorettomiin kohtiin, jotka eivät ole liian lahoja tai märkiä. Rusovanukka kasvaa harvinaisena suurimmassa osassa Suomea, maan pohjoisosasta laji puuttuu.

Nykytila ja uhkatekijät

Rusovanukka on taantunut lahoppuun ja vanhojen metsien vähenemisen takia. Lähes kaikki rusovanukan nykyiset tunnetut kasvupaikat on suojeltu.

Hoitosuositukset

Rusovanukan esiintymispaikka tulisi rajata metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Lähiympäristössä tulisi säästää järeitä huonokuntoisia ja kuolleita havupuita, myös maahan kaatuneita. Runsaslahoppuustoisten metsien vapaaehtoiseen suojeluun on mahdollista hakea rahoitusta METSO-ohjelman kautta.

Lähteet

Kotiranta, H. Saarenoksa, R. & Kytövuori, I. 2009: Aphyllophoroid fungi of Finland. A check-list with ecology, distribution and threat categories. – Norrlinia 19:1–223.

Larsson, K.-H. Faktablad: *Amylocorticium subincarnatum* – *Rosa jordskinn*. Teoksessa Larsson, K.-H. (red.). 1997. Rödlistade svampar i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 547 s.