

Vyökeiju

Enbandad brunbagge

Hypulus bifasciatus

Uhanalaisuusluokka (IUCN): silmälläpidettävä (NT)



Luonnehdinta

Vyökeiju on noin 6 mm pitkä, punaruskea kovakuoriainen. Sen peitinsiivissä on selvä musta poikkivyö ja lisäksi epämääräisempiä kirjailuja.

Elinympäristö ja levinneisyys

Vyökeijun toukat kehittyvät lahoavassa puussa, joka on yleensä vielä melko kovaa, ja jota ei saa sormin rikottua. Isäntäpuuksi kelpaavat useat lehtipuut, esimerkiksi pähkinäpensas, tervaleppä ja orapihlajat. Toukat elävät kaatuneissa, melko ohuissa rungoissa, jotka pysyvät tasaisen kosteina. Toukkia voi löytää myös kantojen maata lähellä olevista osista. Löytöpaikat ovat yleensä tiheissä, harventamattomissa, kosteahkoissa lehtimetsissä, usein lähellä rantaa. Sukupolviaika on kaksivuotinen. Toukat koteloituvat jo syksyllä ja aikuisia kuoriaisia tapaa kesäkuussa lahoppuun pinnalta. Laji saattaa elää samassa lahoppuussa useiden sukupolvien ajan. Vyökeiju on Suomessa eteläinen laji, jota tavataan etelä- ja lounaisrannikolla, lounaissaaristossa ja Ahvenanmaalla.

Nykytila ja uhkatekijät

Vyökeiju on uhanalaistunut lahoppuun vähenemisen ja metsien puulajisuhteiden muuttumisen takia. Ne uhkaavat sitä edelleen.

Hoitosuositukset

Vyökeijun esiintymispaikka tulisi rajata metsänkäsittelyn ulkopuolelle ja esiintymispaikan ympäristö säilyttää jatkuvasti peitteisenä. Myös lähialueen kuolleet pysty- ja maapuut olisivat tärkeä säästää, jotta lajille elintärkeä lahoppuujatkumo ei katkeaisi.

Lähteet

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsnag i bark och ved. ArtData-banken, SLU, Uppsala. 512 s.

Kuva: Juhani Päivärinta