




Malmin louhinnasta, rikastushiekka-alueelta ja sivukivenläjitysalueelta aiheutuvan pölyn (PM_{10}) tuntipitoisuuksien aikasarjat Sirniössä, Loukuskylässä, Kostonjärvellä, Raiskiovaarassa ja Pätsinahon risteyksessä on esitetty kuvissa 1-5.




Kuva 1. Pölyn tuntipitoisuuden aikasarja Sirniössä.




Kuva 2. Pölyn tuntipitoisuuden aikasarja Loukuskylässä.



Kuva 3. Pölyn tuntipitoisuuden aikasarja Kostonjärvellä.




Kuva 4. Pölyn tuntipitoisuuden aikasarja Raiskiovaarassa




Kuva 5. Pölyn tuntipitoisuuden aikasarja Pätsinaho risteyksessä.


Vaihtoehdossa VE-2 syntyvät savukaasujen (SO_2) tuntipitoisuuksien aikasarjat Sirniössä, Loukuskylässä, Kostonjärvellä, Pätsinahon risteyksessä ja Matalaisessa on esitetty kuvissa 6-10.




Kuva 6. SO_2 -tuntipitoisuuden aikasarja Sirniössä




Kuva 7. SO_2 -tuntipitoisuuden aikasarja Loukuskylässä



Kuva 8. SO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Matalaisessa.




Kuva 9. SO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Kostonjärvellä.




Kuva 10. SO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Pätsinahon risteyksessä


Vaihtoehdossa VE-2 syntyvät savukaasujen (NO_2) tuntipitoisuuksien aikasarjat Sirniössä, Loukuskylässä, Kostonjärvellä, Pätsinahon risteyksessä, Raiskiovaarassa ja Matalaisessa on esitetty kuvissa 11-16.




Kuva 11. NO_2 -tuntipitoisuuden aikasarja Sirniössä.




Kuva 12. NO_2 -tuntipitoisuuden aikasarja Loukuskylässä




Kuva 13. NO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Matalaisessa



Kuva 14. NO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Kostonjärvellä



Kuva 15. NO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Raiskiovaarassa.



Kuva 16. NO₂-tuntipitoisuuden aikasarja Pätsinahon risteyksessä